


يحيى مهير نبات

معجم المصطلحات

علم الفلك



قال تعالى: «قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلْمَاتِ رَبِّي
لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلْمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا^{١٤}
بِمِثْلِهِ مَدَادًا»

معجم مصطلحات
علم الفلك

محجر مصطلحات

علم الفلك

تأليف

يحيى محمد نبهان

الطبعة الأولى

ـ ١٤٣٠ م - ٢٠٠٩



دارالبلد لاشرونوموغرافى

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (٢٠٠٣/١١/٢٠٠٦)

٥٢٠١

نبهان، يحيى محمد
معجم مصطلحات علم الفلك / يحيى محمد نبهان
عمان: دار البدائية، ٢٠٠٦.

(ص) ٣٠٠٣/١١/٢٠٠٦.
ر.ا:

الوصلات: / الفلك الواقعي // الفلك // القوميس/

* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية.

حقوق الطبع محفوظة للناشر

Copyright ®
All Rights reserved

الطبعة الأولى

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م



لنشر وطبع ووزع

دار البدائية لالبرون ووزعون

عمان - شارع الملك حسين - مجمع الفحيحين التجاري

هاتف: ٤٦٤٠٦٧٩ - ٤٦٤٠٥٩٧ - تلفاكس: ٤٦٤٠٥٩٧

ص.ب. ٥١٠٣٦ عمان ١١٥١ الأردن

الإهداء

إلى كل الشهداء الذين سوت
دمائهم أرض فلسطين الطهور

المقدمة

ما لاشك أن علم الفلك من أقدم العلوم التي مارسها الإنسان منذ القديم، حين نظر برهة إعجاب إلى السماء بنجومها وكتلها، وبدأ الإنسان في ذلك الزمان يجول في فكره شرقاً وغرباً في تفسيرات لمظاهر الكون، مما جعله يعتقد أنها آلهة أو من صنع آلهة، وتارة يعيدها إلى قوى خفية وتارة بعضهم يضفي على نفسه صفة السحر والادعاء بالتنبؤ ومعرفة الغيب .

واهتمت الشعوب منذ القديم بالظواهر الفلكية، ونلاحظ من خلال اطلاعنا على علماء الذين سجلوا تاريخ الحضارات القديمة عبر علومهم، وكان علم الفلك أحد العلوم التي يبحثون فيها، أمثال أريستوخوس 310 - 230 ق م وأيراثوسين 195 - 275 ق م وأبو الحسين عبد الرحمن السرازي الصوفي 903 - 986 م وأبناء شاكر، وأسحق نبوتن 1642 - 1727 م والبيروني 973 - 1048 م ، والباتاني 850 - 929 م ، وغيرهم الكثير .

وخلال التاريخ الطويل لعلم الفلك لم يخلى شعب من الشعوب من تمثل الكواكب بأشكال مختلفة آدمية تارة وحيوانية أو بشكل آلة تارة أخرى ، مثل القوس " الرامي " والدلو " ساكي الماء " والعذراء " السنبلاة " والجوزاء " التوأمان " وما إلى غير ذلك . ومثل المصريون القدماء السماء بأمرأة منحنية بطنها مليئة بالنجوم يحملها رجل وجعلوا الأرض رجلاً يثبت عليه الزرع . ولا زال هذا الكون يحوي الكثير من المفاجآت التي يحاول الإنسان جاهداً إرسال أقمار صناعية إلى الكواكب الأخرى وخاصة كوكب المريخ لعل وعسى يكتشف حياة أخرى على هذا الكوكب ، أو بقوله تعالى : { يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَنَّوْا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاتَّفَنُوْا لَمَّا تَنَفَّدُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ }

الرحمن آية رقم (33) .

إلا أن الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من غزو الفضاء الكوني، دفعت بفروع هذا العلم لتخوض خطوات واسعة إلى الأمام، إذ زاد الاهتمام بعمليات الرصد للنجوم وما تأثيرها على حياة البشر، وتسابقت الدول في رصد طبقات الجو العلوية الممتدة إلى ارتفاعات شاهقة، فاستحدثت أجهزة عديدة لغزو تلك الطبقات كالأجهزة الإلكترونية، والصواريخ، وأجهزة الرادار، والأقمار الصناعية التي يعتبر استخدامها نقطة تحول خطيرة في علم الفلك والأرصاد الجوية بما فتحت من آفاق واسعة لا حد لها، وفي مستهل عصر الفضاء بدأت عمليات جمع الأرصاد وتصوير تجمعات السحب من أعلى الجو ومن الفضاء الخارجي باستخدام الأقمار الصناعية.

لهذا جاءت فكرة الكتاب لما لعلم الفلك من أهمية ويعتبر من أمنع العلوم وأكثرها غموضاً وتشويقاً في الوقت نفسه، إذ ما زالت حتى الآن الدول العظمى ترسل أقمارها الصناعية أما بغرض اكتشاف سبق علمي أو عملية التجسس على كثير من الدول خاصة التي تتنافسها في هذا العلم أو غير ذلك .

حيث أخرجت هذا الكتاب في قالب علمي فيه تبسيط وإمتناع قدر المستطاع، وذلك حتى لا تستأثر بالفائدة منه طائفة دون الأخرى، وحتى يساير ركب التطور الذي يسير بخطى سريعة في علم غزو الفضاء، فهو مرجع لا غنى عنه لطلبة معاهد الملاحة الجوية والبحرية ونحوها من المدارس ، ويتضمن الكتاب أيضاً مصطلحات باللغة الإنجليزية ومعناها باللغة العربية .

وأخيراً إن عمل ابن آدم لا يخلو من ونات فالكمال لله سبحانه وتعالى ، وأنعنى أن أكون قد أسمحت في رفد المكتبة العربية، وأن يسجل هذا العمل في ملزان حسناتي إنشاء الله .

وأخيراً شكر خاص لأبنائي جميعهم الذين ساهموا معي في طباعة هذه المادة
وزوجتي التي ما برحَت تفارقني في سهري .

المؤلف

والله من وراء القصد

حرف المثلث

▪ ابن الشاطر : 1304 – 1375 م

فلكي عربي كان ميقانياً ورئيس المؤذنين في الجامع الاموي بدمشق، له حوالي 32 مؤلفاً في الفلك واستخدم أدوات الرصد، وجميعها مخطوطة ومتناشرة في المكتبة الظاهرية بدمشق وحلب والازهر ودار الكتب المصرية واكسفورد ومانشستر والمتحف البريطاني وميلانو ومكتبة الكونغرس الامريكي .

ونتيجة أرصاده ثبت له خطأ نظرية بطليموس في دوران الكواكب والشمس حول الأرض وأثبت بقوله [لذا الأرض والكواكب المتحدة تدور حول الشمس بانتظام والقمر يدور حول الأرض] ، وذلك قبل كوبرنيكوس بحوالي قرنين من الزمن . يقول عنه المستشرق ديفيد كنج :

(إنه ثبت عام 1370هـ / 1950م أن كثيراً من النظريات الفلكية المنسوبة إلى كوبرنيكوس قد أخذها هذا الأخير عن العالم المسلم ابن الشاطر . ومن أعماله :

1. له العديد من المخطوطات تتعلق برصد الكواكب والنجوم .
2. صنع ربعة خاصة سميت الربع العلائي نسبة إليه علي بن ابراهيم "ابن الشاطر" .

3. وضع جهازاً سمي بالبسيط لتحديد مواقع الشمس والنجوم، نسج على منواله بعده المقلدون في المسجد الأموي .

▪ ابن يونس

أبو الحسن علي الصوفي توفي 399هـ / 1008 م ، فلكي مصرى عمل في الفلك والرياضيات وحساب المثلثات، ألف كتاب الزيج الحاكم الكبير صنفه الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي يتحدث فيه عن ضرورة تحديث المعلومات الفلكية التي بنيت على الأرصاد القديمة، أقام مرصد على جبل المقطم قرب القاهرة عدد

في جدوله 277 مدينة وصور الكواكب الـ 48 المعروفة في عهده يعده المستشرق كرانشكونوفي أعظم فلكي عربي بعد الباتاني ويرجع إليه الفضل في اختراع الرقاص .

■ أيراتوستين

عالم فلكي من أصل يوناني، ولد في الشحات بلبيبا 275-195ق.م. درس في الإسكندرية وكتب في الشعر والفلسفة والتاريخ والجغرافيا، اشتهر بطريقة قياس محيط الأرض بالاعتماد على أشعة الشمس التي تسقط عمودية على أسوان في 21 حزيران وقياس الزاوية بين السمت وأشعة الشمس في الإسكندرية فعرف الزاوية التي تساوي $1/50$ من محيط الأرض فضرب المسافة بين الإسكندرية وأسوان بـ 50 وحسب بذلك محيط الأرض .

جمع المعلومات الجغرافية في عصره في كتاب سماه ((الجغرافيا)) وهو أول من استعمل الكلمة للتعبير عن العلم .

■ أبناء شاكر

ثلاثة أخوة عملوا في الفلك وفي رواية لابن خلkan أن المأمون الخليفة العباسى طلب من أبناء موسى بن شاكر (محمد وأحمد وحسن) أن يقسموا درجة من درجات العرض فاتجهوا إلى الصحراء سجراً وأخذوا ارتفاع نجم القطب الشمالي وساروا شمالاً حتى وصلوا إلى نقطة ازداد فيها ارتفاع نجم القطب درجة واحدة وفاسوا المسافة وكانت $3/2$ ميلاً ثم عادوا إلى مكان الوتد الأول وتوجهوا جنوباً حتى نقص ارتفاع نجم القطب درجة واحدة (وكانوا يقيسون المسافة بالحبال) وإن المأمون طلب منهم إعادة القياس في أرض الكوفة فتوافق الحسابان، وفاسوا محلة باب الطاق ببغداد فكانت (23 درجة - 20°) . وهو ما تتطبق عليه القياسات الحالية .

▪ اسحق نيوتن

فلكي بريطاني 1642-1727م اكتشف قانون الجاذبية ووضع لها ثلاثة قوانين كان لها أثر كبير في دراسة علم الفلك والتبيه إلى اهتزاز حركة الكواكب وعدم تنظيمها.

كما اكتشف طريقة الحصول على طبيعة الأجسام المضيئة عن طريق تحليل الضوء إلى طيف بوساطة المنشور الزجاجي، وقد فتحت الطريقة عالماً واسعاً لمعرفة تركيب عناصر النجوم والكواكب بعد تحليل أطيافها.

▪ الدموند هالي

فلكي بريطاني 1656-1742م رسم خريطة للسماء في نصف الكرة الجنوبي من جزيرة سانت هيلانة .

حدد مسار المذنب الذي دعي باسمه وقال: إن المذنب يعود كل 76 سنة مرة، وتبدأ بعودته عام 1758 .

وأثبت أن النجوم ليست ثابتة في أماكنها على المدى الطويل مستعيناً بما رصده الإغريق وتغير أماكنها عن زمانهم .

▪ افتراء:

- (1) القرب الظاهري لجرمين سماوين إلى بعضهما البعض .
- (2) موقع جرمين سماوين عندما يكونان في نفس الاتجاه تقريباً إذا نظر إليهما من الأرض .

▪ أكتينو غلاف

جهاز يقوم بشكل آلي ومستمر بالقياس والتسجيل الإشعاعي الشمسي المباشر والمنشر .

▪ أكتينو ميتر

جهاز وظيفته قياس شدة الإشعاع الشمسي .

▪ أكيليل

- (1) الهالة الضوئية المشعة التي تحيط بالشمس أو القمر والتي يمكن رؤيتها بوضوح حول الحافة المظلمة من القمر عند حدوث خسوف كلي.
- (2) مجموعة من الحلقات الملونة التي تحيط بالشمس أو القمر والتي تكون في مجموعها حلقة داخلية تميل إلى الحمرة، وهذا عكس تتابع الألوان في الهالة .

▪ أبو الحسين عبد الرحمن الرازى الصوفى

903-986م أحد كبار الفلكيين، ولد في الري (طهران) واتصل بعهضه الدولة البويهية، أهم مؤلفاته "صور الكواكب الثمانية والأربعين" بناءً على أرصاد دقيقة لموقع الكواكب والنجوم وأقدارها .
وكان يعتقد أن الكواكب الرئيسة المعروفة آنذاك تبلغ 48 كوكبًا.
وفي ثابيا الأطلس وفي المصطلحات الفلكية نماذج منها .

▪ ابن قتيبة الدينوري

توفي 282هـ / 895م كان قاضيا بمدينة الدينور لم بمعارف عصره فألف في اللغة والنحو والشعر ، وضع كتابا سماه (الأنواء) تكلم فيه عن النجوم وكيفية استدلال العرب بها، وذكر البارع منهم بهذا العلم من القبائل والرجال .

▪ أبو القاسم مسلمـة المجريطي الأندلسـي

950-1007م من أوسع العلماء الأندلسيـين إـحاطـة بـعلمـ الفـلكـ وـحرـكاتـ النـجـومـ، قـامـ بـرـصدـ الكـواـكبـ وـدرـسـ زـيـجـ الـخـوارـزمـيـ وزـادـ عـلـيـهـ لـهـ .
كتـابـ الإـسـطـرـلـابـ، واـخـتـصـارـ تـعـديـلـ الكـواـكبـ فـيـ زـيـجـ الـبـاتـانيـ، جـعـلـ بـدـءـ خطـوطـ الطـولـ هوـ الخطـ المـارـ مـنـ مدـيـنـةـ قـرـطـبـةـ بـالـأـنـدـلـسـ .
ترـجمـتـ مؤـلـفـاتـهـ فـيـ الـحـاسـبـ وـالـهـنـدـسـةـ وـالـإـسـطـرـلـابـ إـلـىـ الـلـاتـينـيـةـ .

▪ أريستاخوس

310 - 230 ق.م أكبر عالم فلكي يوناني، قال بنظام المجموعة الشمسية وجعل الشمس مركز الكون قبل كوبرنيكوس .

قال عنه غاليليو: (إن كوبرنيكوس لم يكن الأول الذي اكتشف حقيقة المجموعة الشمسية بل كان أريستاخوس) .

ولم تعرف نظريته مبكراً لأن الفيلسوف أفلاطون أمر بإحراف كل كتاب أريستاخوس البالغة 70 كتاباً، ويعيد المحاللون إلى صراع بين الفلسفة والعلم.

▪ ألبرت أينشتاين

1879-1955م عالم رياضيات قدم نظريته الأولى باسم النسبية الخاصة تتعلق بالأجسام التي تتحرك بسرعة ثابتة بالنسبة للمشاهد وبخطوط مستقيمة . وقدم نظريته الثانية باسم النسبية العامة وهي تتعلق بالأجسام التي تكون سرعتها متزايدة بالنسبة للمشاهد .

واعتبر أينشتاين أن الكون مغلق لا بداية له ولا نهاية بشكل كرة مغلقة ولكنها ممتدة في الاتساع وإن الفور الذي ينطلق من نقطة ما سيرتد إليها بعد 200 تريليون سنة من سنتين أرضنا، ولكن الدراسات الفلكية الحديثة أثبتت أن الكون يتسع وإن المجرات تطلق فيها متباعدة عن بعضها .

واعتبر أينشتاين أن الزمان هو البعد الرابع واعتبر أن هناك علاقة بين الزمان والمكان ذي الأبعاد الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع) وأنهما متشابكان وبخاصة عند النظر في الكون والمجرات نظراً لسرعتها الهائلة وبعدها الكبير .

▪ أدوبين هيل


فلكي أمريكي معاصر 1889-1953 قام برصد ملايين النجوم من مرصد جبل بالومار وقام بتصنيفها في مجموعات، أعلن أن الكون أكبر مما كان يتصوره العالم آنذاك، وفي 24 نيسان 1990 أرسل مقراب (منظار) إلى ارتفاع

610 كم فوق سطح الأرض باسم مقراب هيل تكريماً لهذا العالم استغرق انجازه قرابة 20 سنة وهو مجهز بحواسيب خاصة آلية وكاميرات متقدمة، وقد صمم المقراب لاكتشاف أبعد الأجسام الكونية وهو يرى أجساماً على بعد 14 مليار سنة ضوئية وأرسل صوراً للمريخ والمشتري وضحت الكثير من المعلومات عنها ويتوقع علماء الفلك منه الكثير .

وضع تصنيفاً للمجرات ما زال يعمل به حتى الآن .

• الأرض :

يبلغ قطرها حوالي (7900) ميل، وتبعد عن الشمس بمقدار 93 مليون ميل، ولها تابع وهو القمر ويدور حولها كل (27) وثلث يوم، وللأرض دوران، دورة حولها محورها كل 24 وعشرين ساعة تقريباً، ولهذا ينشأ عنها الليل والنهار، ودورة حول الشمس تتمها في 365 وربع يوم، ونظراً لميل محور الأرض عن الوضع العمودي لمستوى دورانها بمقدار $\frac{1}{2}$ وثلاث هذا الميل في اتجاه واحد، فقد نشأت الفصول الأربع المعروفة.



• الأرضي القمرية السهلية:

ويقصد بذلك مناطق السهول الواسعة الحوضية الشكل الكبيرة الحجم .
وتنتمي هذه الأرضي بلونها القاتم ويطلق عليها الفلكيون اسم بحار القمر
. Maria

• الأرضي القمرية المضرضة

ويقصد بذلك مناطق المرتفعات وحقول الفوهات شبه البركانية وفوهات
النيازك و الشهب ، وتنتمي هذه الأرضي بلونها الفاتح ويطلق عليها الفلكيون اسم
أرضي القمر . Terrae

• الأسد : "برج"

يطلق في الفلك على البرج الخامس والكوكبة التي يحتويها ، وهو مشتق من أسد
نيميان الذي قتله هرقل كما تقول الأساطير الإغريقية القديمة ، وألمع نجمين في
الكوكبة قلب الأسد والصرفة ، وبها أربع منازل قمرية هي الصرفة والجبهة والزبرة
والطرف .


• الإسطرلاب الحديث

يقاس به ارتفاع النجم اعتماداً على مبدأ دخول الشعاع النجمي من " 3 "
الذي يقع على المؤشر أو على سطح الزئبق " 2 " فيكون صورة مزدوجة على
طول خط المسافته " 1 " وعند تحرك الجرم تفصل الصورتان ويقاس هذا
الانفصال بالقرص " 4 " الذي يعطي ارتفاعه الجرم السماوي المتحرك ومدى
حركته .

• الإسطرلاب

هو آلة حاسبة وجهاز لقياس الزوايا تطور مع الزمن إلى آلة السادس
المستعملة حالياً في البحر والجو وقد عده الفزاري وجعله مناسباً للتقويم الهجري
ويستفاد منه في معرفة أوقات الصلاة وله وجهان الأول يحمل ذراعاً مرتزاً في

وسطه دائرة مدرجة لقياس الزوايا بالنسبة للنجوم والثاني يحمل شبكة متقدمة تمثل النجوم الرئيسية في السماء بحسب خط عرض معين للرصد.



▪ اسحق نيوتن 1642 - 1727

فلكي ايطالي وضع قانون الجاذبية العامة : (كل شيء يجري في العالم كما لو كانت الأجسام تتجادب بصورة متناسبة مع كتلتها ومع عكس مربع أبعادها) . واكتشف طريقة الحصول على طبيعة الأجسام المضيئة بطريقة التحليل الطيفي بالمنشور الزجاجي ومنها عرف العالم العناصر المكونة للنجوم والكواكب البعيدة من تحليل ضوئها بالمطياف .

▪ الاستشعار عن بعد

يعني رصد الأجسام وأخذ القياسات من مسافات بعيدة دون حدوث أي تماش مع تلك الأجسام، ظهر استعمال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد في عام

(1960) ليصبح العقل العلمي الرديف لعصر الأقمار الصناعية وما تقدمه هذه الأقمار من معلومات لكل ما يغطي سطح الكرة الأرضية.

• الإشعاع أو الطاقة الأثيرية

الكون مادة وإشعاع، والمعنى بالإشعاع تلك الطاقات "غير المادية" التي تلمس أثارها دون أن تتجسم في صورة المادة ويطلق عليها اسم الموجات الأثيرية.

ومن هذه الموجات ما تستشعره حواسنا مباشرة مثل الحرارة التي تستجيب لها حاسة اللمس خاصة ويطلق عليها في الكتب العلمية عادة اسم الأشعة تحت الحمراء، ومثل الضوء الذي تميزه الأعين والضوء الأبيض الذي ترسله الشمس هو مجموعة الأشعة المرئية ذات الألوان المختلفة.

ومن الموجات الأثيرية ما تلمس أثارها فقط مثل الأشعة فوق البنفسجية التي عندما تتعرض لها الأجسام على سواحل البحر أو فوق الجبال تكسب البشرة لوناً برونزياً خميلاً، ومثل أشعة إكس المعروفة في تصوير الأجزاء الداخلية للأجسام.


وتنقل هذه الإشعاعات في الفضاء "في الهواء الجوي" على صورة أمواج تتشالا بسرعة الضوء (أي 300000 كيلومتر في الثانية)، والمقصود بالأمواج تلك الحركة ذات الطابع الخاص بتكرارها في الوسط الذي تنتشر فيه، على غرار أمواج البحر مثلاً.

ولكل موجة أثيرية "أكمواج اللاسلكي مثلاً" طول خاص يقاس عادة بالمتر أو المستيمتر أو "في حالات الأمواج القصيرة" بوحدة يقال لها "ميكرون" وهو جزء من عشرة آلاف جزء من المستيمتر الواحد، وعدد مرات تكرار الموجة في الثانية يسمى الذبذبة أو التردد.

• اعتدالان

ذلك الوقت من السنة الذي تكون فيه أشعة الشمس عند الظهر عمودية على خط الاستواء فيها يتساوى الليل والنهار في مناطق سطح الأرصاد جميعها، ويحدث

الاعتدال أن سنوياً، إحداهما في (21) آذار ويسمى الاعتدال الربيعي، وثانيهما في (23) أيلول ويسمى الاعتدال الخريفي.



▪ أعلى مرصد

أعلى مرصد في العالم في دنفر بولاية كولورادو على ارتفاع 4297 متراً، وقد دشن سنة 1973م ، واهم آلة فيه التلسكوب العاكس وقطره " 60,48 سم " .

▪ الأوكسجين


وهو يشمل على 21% من حجم الهواء الجاف النقي و23% من وزنه وهو ضروري للتنفس وعمليات الاحتراق وهو غاز قليل الذوبان في الماء وما يذوب منه هو ضروري لتنفس الحيوانات والنباتات.

▪ الأوزون

تحتوي جزيئات غاز الأوزون عنصر الأوكسجين حيث ترتبط كل ثلاثة ذرات من الأوزون لتكون جزيئاً واحداً وصيغته O₃ وأهميته هي امتصاص الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية.

ويوجد الأوزون في طبقات الجو على ارتفاع يتراوح بين 30 - 45 كيلو متراً .

إن زرقة السماء في النهار ناتجة عن تشتت نور الشمس عند مروره من خلال الغلاف الجوي للأرض الذي يمتص بعض أنواع الأشعة .
ويعمل على تشتت بعضها الآخر أضعف إلى الدور الذي تلعبه ذرات الغبار و قطرات الماء العلقة في جو الأرض ، وهذا يفسر لمعان السماء في النهار .



• أفق (أوهج) أبي

لون أبيض وردي محمر يظهر لفترة قصيرة فوق قمم الجبال المغطاة بالثلوج، بعد غروب الشمس مباشرة، وقبل شروقها أيضاً .

ويبدأ هذا الأفق (الأوهج) عندما يكون قرص الشمس فوق الأفق بمقدار درجتين تقريباً، وتكون الألوان بيضاء أرجوانية في الصباح وبرتقالية في المساء .

• أوج قمري

هو النقطة من مدار القمر عندما يكون في أكبر بعد له عن الأرض، حيث يكون القمر عندها على بعد 398.579 كم عن الأرض .

• أكبر تلسكوب شمسي

إن أكبر تلسكوب شمسي في العالم هو مرصد كت بيك قرب تو سون بولاية بيروزونا في الولايات المتحدة له قوة حصر 91,44 متراً ومرآة عاكسة لأشعة الشمس حجمها 2,03 م و قد تم بناؤه عام 1962م وبإمكانه إنتاج صورة قطرها 83,8 سم .

• أقدم مرصد

أما أقدم مرصد للنجوم ما زال قائماً هو برج الرياح الذي كان يستخدمه اندرونيوكوس في أثينا باليونان حوالي 70 ق.م والمجهر بمزاول وساعات مائية .

• أقمار غاليليو

أربعة أقمار تدور حول المشتري اكتشفها غاليليو وهي آيو ويوروبي وجانمين وكاليستو .

• أكسو سفير

أول (الغلاف الخارجي) وطبقة الغلاف الجوي التي تلي طبقة الايونوسفير ارتفاعاً ، وفيها ترداد درجة الحرارة مع الارتفاع حتى تصل إلى نحو (2200) مئوية .

• الانحساف


هبوط سطح الأرض نتيجة فقدان المياه التي تملأ مسامات التربة والصخور ، مما يؤدي إلى هبوطها تحت تأثير الصخور الطويلة .

• الانعكاسية

النسبة المئوية لما ينعكس من النجم من الأشعة المساقطة عليه .

▪ انقلاب

الوقت الذي تكون فيه الشمس عمودية على أقصى نقطة متعددة عليها، بعيداً عن خط الاستواء ويحدث الانقلاب الشتوي بالنسبة لبلادنا بتاريخ (21) كانون الأول والانقلاب الصيفي بتاريخ (21) حزيران من كل عام.



▪ الانقلاب المغناطيسي

انقلاب المجال المغناطيسي الأرض 180 درجة.

▪ الأوج

نقطة على المسار البيضاوي للكوكب حول الشمس، يكون عندها الكوكب في أبعد نقطة له عن الشمس.

▪ اعتدال "فلكي"

هو الحالة التي تكون فيها الشمس أثناء حركتها الظاهرية حول الأرض "دائرة الكسوف" متعددة تماماً مع الدائرة الاستوائية، ويحدث ذلك في فترتين من

الستة (21 ذار ، 23 أيلول) ، حيث تشرق الشمس في تلكما الفترتين من الشرق تماماً وتغرب عند نقطة الغرب تماماً .

• أورانوس

يبلغ قطره نحو (32.000 ميل) وبعده عن الشمس (1780) مليون ميل، ويدور حول الشمس كل (82) سنة وله أربعة أقمار تدور حوله في مدار عمودي على مداره حول الشمس .

• أيونوسفير

طبقة من الهواء المتأين في الغلاف الجوي تحيط بالأرض، ارتفاعها يتراوح بين (50-1000) كم، وذلك تبعاً للفصول والموقع الليل والنهار وتعكس موجات الراديو، كي تصل إلى مسافات بعيدة وتلبي طبقة الستر انوسفير .

• آخر نهر

نجم الفا النهر يعرف بالظليم قدره 0.6 وطيقه بـ 5 ، ويبعد عنا 73 سنة ضوئية .

• أمثاليا

تابع المشتري اكتشف 1892 وسطي بعده عن المشتري 181 ألف كم دورانه حول نفسه 11 سا و 57 د ، قطره 200 كم القمر الخامس للمشتري .

• أبو سيف

كوكبة جنوبية أعلىها غيمة ماجلان الكبرى ودلتا النجم يبلغ ضياؤها 500000 من ضياء شمسنا .

• أبو لو

كوكبة صغيرة قطرها 2 كم .

• أحزنة فان آن:

جسيمات طاقتها عالية بشكل حزامين أسرهما المجال المغناطيسي للأرض يشكلان عقبة في اكتشاف الفضاء من سطح الأرض اكتشفهما فان آن من الولايات المتحدة .

• اختلاف المنظر

تغير ظاهري للجسم السماوي بسبب اختلاف مكان الناظر إليه .

• أرغون

عنصر كيميائي يؤلف من الهواء 1/1000 غاز لا رائحة ولا طعم ولا لون.

• الأربن

كوكبة جنوبية بشكل معين تقع جنوب الجبار وشرق الكلب الأكبر ، أهم نجومها الفا الأربن من القدر 2.7 تضم 12 نجماً ظاهرياً .

• أرييل

تابع لأورانوس ، قطره 1500كم ، اكتشف عام 1851 .

• الإزار

نجم في العواء (إيسيلون العواء) ، ويسمى مراق الإزار، وتتابع السمك ورأية السمك ورأية الفكة .

• الآزوت

غاز عديم اللون والطعم والرائحة يدخل في تركيب الهواء ويشكل عنصراً ضرورياً لحياة الحيوان والنبات .

▪ استريا

كوكبة بين المريخ والمشتري اكتشفت عام 1845 من قبل الألماني هنكه .

▪ الأسد

كوكبة في النصف الشمالي وشكل أحد البروج ، تنزلها الشمس في شهر آب وعدد نجومها 35 نجماً منها:
ألفا الأسد : القلب .

بيتا الأسد : ذنب الأسد .
عما الأسد : الجبهة

▪ الأسد الأصغر

كوكبة شمالية جنوب الدب الأكبر . حدد مكانها عام 1690 من قبل الفلكي هيليوس .

▪ الأشرعة

كوكب في كوكبة السفينه الموجودة في سماء النصف الجنوبي وتسمى الشراع .

▪ الإشعاع الشمسي

الطاقة المنبعثة من الشمس والتي يمتص الأوزون جزءاً منها لتصل إلى الأرض بكمية مناسبة .

▪ الإشعاعية

تعبير عن كثافة الضوء الواقع على 1 سم² من سطح جسم ما .

▪ أشعة بيتا

الكترونات تطلق من ذرات نشاط إشعاعي .

• أشعة سينية

تسمى أحياناً أشعة رونتجين باسم مكتشفها الألماني وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ضوئية قصيرة الأمواج يتراوح طولها بين 0.0003 و 0.01 ميكرون .

• أشعة فوق بنفسجية

موجات كهرومغناطيسية أطوالها بين الأشعة السينية غير المرئية والضوء المرئي .

• أشعة كونية

إشعاع مرتفع الطاقة مصدره فراغ بين الكواكب يؤدى الهواء بانفلاع الالكترونات من الذرات، تزداد عند القطبين .

• الإعتدالين

في علم الفلك : الاستواءان، اعتدال ربيعي في 21 آذار (مارس) و خريفي يبعد 180 درجة عن الربيع ويقع بين 22-23 أيلول (سبتمبر) .

في الجغرافيا : الأول بدء فصل الربيع والثاني بدء فصل الخريف وفيها تقع أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء .

• الاقتران

التقاء جرمين سماويين أو أكثر عند درجة حرارة في منطقة البروج وهو نوعان :

اقتران مختلف : الجرم بين الأرض والشمس .

اقتران متقدم : الشمس بين الأرض والجرم .

• ايکروسفیر

الحدود النهاية للغلاف الجوي يندر فيها اصطدام جزيئات الغاز لتخليها
والتي تشدّها الجاذبية .

• اوکسجين

غاز رمزه O أكثر العناصر انتشاراً في الطبيعة لا لون ولا طعم ولا
رائحة . يتحد مع العناصر وبخاصة الهيدروجين ليتشكل منها الماء، وهو عماد
الحياة الحيوانية والنباتية والتنفس والاحتراق .

• الإكليل

في الفلك هو الضوء الساطع الذي يحيط بالشمس .

• الإكليل الجنوبي

كوكبة في سماء نصف الكرة الجنوبي وتسمى القبة أو الخباء أو أذحي
النعام نجومها 13 نجماً

• الإكليل الشمالي

كوكبة في سماء النصف الشمالي بين العواء والجاثي فيها 21 نجماً منها :
ألفا الإكليل الشمالي هو الفكهة بينما الإكليل الشمالي النسق الشامي والنسل اليماني .

• البيدو

نسبة الضوء المنعكس على سطح غير مصقول إلى الضوء الساقط عليه
كالضوء المنعكس من القمر أو الكواكب .

• أمبريل

تابع اورانس ، قطره ألف كم .

• اومور

كويكبه تقترب من الأرض قطرها 8 كم .

• الانحراف

انقال ظاهري لنجم يرى في المرقب .

• الانحراف(التعغير)

انحراف الجرم السماوي عن مداره المألف .

• انحراف زاوي

البعد الزاوي للنجم والكوكب عن خط الاستواء السماوي .

• انسلايدوس

أحد توابع زحل ، كثافته ضعيفة يعتقد أنه من الجليد قطره 600كم.

• اوبيرون

تابع اورانس قطره 1600كم اكتشفه هرشل .

• الأوج

النقطة التي تسير إليها الشمس في الفضاء . أو النقطة التي يكون فيها الكوكب أو الجرم السماوي في أبعد نقطة عن الشمس .

• أورانوغرافيا

علم وصف السماء والأجرام دون تفسير لها .

• أورانولوجيا

دراسة السماء والأجرام بغية تفسيرها .

• أوروبا:

من توابع المشتري اكتشف 1609م من قبل غاليليو يشبه القمر بحجمه وكثافته .

▪ إيروس

كويكب بين المريخ والمشتري ،اكتشف عام 1898 قطرها الكبير 27 كم، والصغير 16 كم ،اقربت من الأرض عام 1931 إلى 23 مل كم.

▪ إيكاروس

كويكب بين المريخ والمشتري مدارها اهليجي بين 28مل و295مل كم عن الشمس.

▪ إيكوسفير

في الفلك: المنطقة التي يحدث فيها الإشعاع الشمسي ظروفاً ملائمة للحياة.

▪ آيونوسفير

الطبقة الخارجية من غلاف الأرض الجوي تكون ذراته متآينة، يختلف ارتفاعها مع اختلاف الوقت والفصل.

هوف الباء

• الباسكال

وحدة قياس الضغط في النظام العالمي، ويساوي نيوتن / متر مربع.

• الباطية : " كوكبة "

توجد في منطقة قلب الأسد ، التي تحتوي أجزاء كبيرة من كوكبات الباطية " الكأس " والشجاع " الحياة المائية " والسرطان، وهي تمثل صورة من قصة الطوفان الذائعة .

• البريق

كيفية عكس جسم المعدن للضوء الساقطة عليه.

• بطليموس كلوديوس : 90 – 168

ينسب إليه النظام البطليومي في ترتيب الكواكب وهو عالم فلك ورياضيات وجغرافيا وفيزياء ومؤرخ وموسيقي .

عرفه العرب باسم بطليموس الإقلوذى، يوناني، مصرى، نشا فى الإسكندرية ألف كتاب الماجستي يبحث فى الفلك والرياضيات وحركات النجوم ويتألف من 13 مقالة تبحث فى البرهان على كروية الأرض وعروض البلدان وأوقات نزول الشمس فى الاعتدالين والإنقلابين وحركات القمر والشمس والكواكب الخمسة وظواهرها واحتفائتها، وقد اثر الماجستي كثيراً فى المفاهيم الفلكية العربية عندما ترجم إلى العربية بترجمات عديدة ولكنه كان يمثل معتقد عصره فى أن الأرض هي مركز الكون، ولبطليموس كتاب فى الجغرافيا .

وقد ترجمه وعارضه عدد من الفلكيين العرب كثابت بن قرة والخوارزمي والبباني والبيروني وغيرهم.

▪ النظام البيطليموسي

- 1. الأرض 6. المريخ
- 2. القمر 7. المشتري
- 3. عطارد 8. زحل .
- 4. الشمس

▪ بلوتو

اسم لكوكب صغير من كواكب المجموعة الشمسية التسعة التي تدور حول الشمس والمعلومات عنه قليلة، وهو الكوكب التاسع والأكثر بعدهاً عن الشمس، ويعتبر حجمه قريب من حجم عطارد.

▪ الباتاني

محمد بن جابر بن سنان ، أبو عبد الله الباتاني 235هـ/314م - 929هـ.

ولد في بستان من أعمال حران على نهر البليج رافد الفرات في سوريا كما يقول ياقوت الحموي .

وهو أحد المشهورين في رصد الكواكب والمتقدمين في علم الهندسة وهيئة الأفلاك وعلم النجوم، كما يقول : إن علم الفلك أشرف العلوم وأحسنها مرتبة وأعلقها بالقلوب وألمعها في النفوس .

بحث في نقطة الأوج وأنت أرصاده قريبة من رصد المحدثين ، قام بأرصاده في مدينة الرقة السورية لذا يقال له الرقاوي أيضاً.

ووجد أن تقهقر الاعتدالين 54.5 ثانية، وأن مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار هو 23 درجة 35 دقيقة .

قام بعمل جداول صحيحة بها مفهوم حركات القمر والكواكب، وقارن بين التقويم العربية والرومية والفارسية والقبطية، وكانت له أبحاث في زوايا والجيوب.

وضع كتاب الزريج الصابئي ضمنه نتائج أرصاد الكواكب ومسارتها وطول السنة الشمسية والأدوات المستخدمة في علم الفلك ومن مؤلفاته : إصلاح المخططي - زيج الزرقالي ويقال له الكرماني - رسالة في الاتصالات - شرح أربع مقالات لبطليموس - معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك 000 وغيرها .

عرفه الغربيون باسم Aibateyni واعتمد عليه دنثرون عام 1749 في تحديد تسارع التقر في حركته خلال قرن من الزمن ، وهناك من يشير إلى أن كوبرنيكوس قد درس أعماله ، ترجمت كتبه إلى اللاتينية واللغات الأخرى وأطلق عليه البعض لقب بطليموس عصره .

■ البيروني

محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني ، ولد في بلدة بيرون من أعمال خوارزم (خيوه حالياً) ، وذلك عام 362هـ / 973م وفي 440 / 1048 م كانت وفاته . اشتهر بالعلوم والرياضيات والفالك والفلسفه والشعر والتاريخ .

ساح في الهند وجمع المعلومات عنها . عمل جداول في الفلكيات والهندسة وبخاصة علم المثلثات ، ووضع كتاباً في الفلك " التقهييم لأوائل صناعة التنجيم " وكتاب " الآثار الباقية عن العصور الخالية " قارن فيه التقاويم المعروفة لدى الشعوب وكتاب " تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذولة " و " القانون المسعودي " ألفه لأمير الغزنوي مسعود ، وهو وجيز في الرياضيات والفالك ووضع نظرية رياضية لمعرفة نصف قطر الأرض ذكرها في آخر كتابه " الإسطرلاب " . وللبيروني ما يزيد عن 120 مؤلفاً ترجم بعضها إلى الانكليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية وقد عرفه الأوروبيين باسم البيورون وتجمع المصادر عنه انه كان عقلاً جباراً نيراً خدم البشرية بعقله وعمله ، وقيل عنه أعظم عقلية عرفها التاريخ ، وكانت بنية وبين علماء عصره مكاتبات كثيرة ومنهم ابن سينا .

بار

وحدة قياس الضغط الجوي وتعادل مليون داين / س م².

باطية

كوكبة جنوبية هي الكأس جنوب الأسد.

بالاس

كويكب صغيرة بين المريخ والمشتري.

بدر

القمر عند اكتماله ليلة 14 من ميلاده.

برق

نور في السماء يحدث أثر احتكاك كهربائي في السحاب بسبب عدم توازن في الشحنة بين السحب أو السحب والأرض.

بروتون

جسيم صغير يشكل نواة ذرة الهيدروجين شحنته موجبة ويشكل مع النيترون أحد عنصري نوى جميع الذرات.

بروكسima

نجم قريب منا 4.3 سنة ضوئية لونه أحمر يدعى قريب الظلمان.

البطين

نجم من نجوم برج الحمل وهو المترزل الثاني للقمر عند العرب.

بلاتيسفير

خريطه مستوية للسماء تجمع نصف الكرة السماوين.

▪ بُلساَر

نجم نيوتروني أصغر من الأفراط البيضاء وأكبر في الكثافة يمكنون في السديم الناجم عن انفجار متعدد أعظم .

▪ بُنات نعش الْكِبْرِي

نجوم في الدب الأكبر هي : ابسيون، وزيتا وإيتا وغما وثلاثة على الذنب .
وهذاك بُنات نعش صغرى في الدب الصغرى .

▪ بوصلة الملاح

كويكب صغيرة جنوبية فوق كوكبه السفينة، عدد نجومها 12 نجماً خافتة
للنور .

▪ بِرُوْج

المنطقة التي يدور في فلكها مدار الشمس والقمر والكواكب الرئيسية
الأخرى. وتقسام هذه المنطقة إلى اثنان عشرة صورة (صور البروج) تمت كل
صورة منها لثلاثين درجة بحسب موقع الشمس في الاعتدال الربيعي، ومن ثم فإن
كل صورة من هذه الصور البروجية تنتظر شهراً من شهور السنة.

▪ بندول فوكو

جهز استخدمه العلامة الفرنسي ليهيرن به على دوران الأرض حول
محورها .

وهو عبارة عن كرة ثقيلة علقت من قمة البانتيون في باريس بوساطة سلك
رفيع بحيث يمكنها أن تتحرك بسهولة في أي اتجاه .
وباهرتاز البندول وجد أن هذه الحركة تتغير لا لسبب واضح سوى دوران
الأرض ذاتها .

▪ يقعه شمسية

يقع على سطح الشمس تكون من الكبر أحياناً بحيث يمكن مشاهدتها من خلال منظار قاتم أو طبقة رقيقة من السحاب بالعين المجردة. ولما زال أصل هذه البقع أمراً غامضاً، ولكن من المعتقد أنها تتألف من كثلة غازية تدور بسرعة داخل الغلاف الجوي للشمس. ولقد دار البحث حول وجود علاقة بين عدد هذه البقع الشمسية وبين حدوث بعض الظواهرات الأرضية ولكن العلاقة الوحيدة المؤكدة هي تلك التي بين الأضطرابات الكهربائية والمغناطيسية على الأرض، فعندما تبلغ هذه البقع أقصاها يبلغ "الهوج القطبي" و"العواصف المغناطيسية" أقصاها أيضاً. وهناك دورة تقريرية في عدد البقع الشمسية التي تظهر على سطح الشمس، وبلغ معدل الفترة التي تتضمن بين الحد الأقصى لهذه البقع الشمسية وبين الحد الأقصى الذي يليه إحدى عشرة سنة.

▪ بيتا

حرف يوناني يطلق في علم الفلك على النجم الثاني في الكويكبات في التصنيف المبني على التأثير الظاهري.

▪ بيتا الأسد

نجم في ذنب الأسد يدعى الصرفة لأن صرف البرد عند سقوطه في الغرب وإنصرف الحر عند طلوعه من تحت شعاع الشمس بالغدوات.

▪ بيتا المرأة المسلسلة

نجم هو جنب المرأة المسلسلة ويسمى أيضاً المرافق وبطن العوت والمنizer والرشا.

▪ بيتا التسر

نجم هو الشاهين ويسمى عنق الغراب.

▪ بيتا النهر

نجم هو كرسي الجوزاء المتقدم .

▪ بيتا نعيم

نجم في كوكبة صليب الجنوب أو نعيم قدره 1.3 تألقه بـ .

حروف النساء

٦- تيغوبراهى

1546 - 186م. فلكي دانيماركي أقام لنفسه مرصدًا في جزيرة هافن وقام بصنع أدوات رصد تمكن بها من رسم خريطة لموقع النجوم في السماء، ودرس مسارات الكواكب وبخاصة المريخ وكان يؤمن أن الأرض هي مركز الكون أن لكل كوكب حركة دائيرية خاصة به ويوفاته سنة 1601 انتقلت جميع دراساته ومؤلفاته إلى مساعدة الألماني جوهانز كيلر الذي اتكب على دراسة هذه المؤلفات قبل أن يخرج بقوانين المعروفة بقوانين كيلر والتي ساعدت كثيراً على تقدم علم الفلك .
وقال بأن للمندبات مدارات أهليجية.

٧- التربوسفير

يبلغ متوسط ارتفاع هذه الطبقة من الغلاف الغازي حوالي (11) كيلو متر عن مستوى سطح البحر تقريباً إلا أن هذا السمك الذي تحدث فيه أغلب الظاهرات العائدة للطقس والمناخ مثل السحب والأمطار والعواصف والأعاصير ومن الملاحظ أن درجة حرارة هذه الطبقة تتناقص كلما زاد الارتفاع وذلك بمعدل درجة متوية واحدة لكل (150) متر تقريباً وتشمل هذه الطبقة على درجة التفريب حوالي (4/5) وزن الغلاف الغازي يرمته، ويطلق على القسم العلوي من هذه الطبقة اسم التروبوبوز وتكون الأخيرة قليلة السمك وتتميز بان درجة حرارتها منخفضة جداً ولا تتناقص بشكل محسوس كلما زاد الارتفاع.

▪ التريوسفير (الطبقة الجوية السطحي)

هي الطبقة التي تمتد لارتفاع حوالي (1000م)، وتشمل طبقة الحد السطحي والطبقة الانتقالية، تمتاز بمعدل انخفاض ثابت لدرجة الحرارة ومعظم التغيرات التي تحدث في الطقس من هذه الطبقة.

▪ تروبيوز

هو الحد العلوي لطبقة تروبيوز.

▪ الترموسفير (جو حراري) :

هي الطبقة التي تمتد من المزوسفير حتى جو الشمس، وتمتاز بارتفاع مستمر في درجة الحرارة علو (180) كيلو متر.

▪ التشتيت

التغير في خط سير الأشعة إذا اعترضتها عائق ويشمل ذلك انعكاس الأشعة وانكسارها وحيودها وغير ذلك.

▪ توقيت (غرينتش)

التوقيت السادس في الجزر البريطانية وأوروبا الغربية وهو التوقيت المحلي (من جرينتش في مدينة لندن على خط طول صفر) وقد يستعمل خط جرينتش تسهيلاً لحساب مواعيد الطائرات أو جميع تقارير الأرصاد الجوية من مختلف أنحاء العالم في وقت واحد ويرمز له بالحروف G.M.T والخطوط التي تأسى بالجهة الشرقية يكون زائد والجهة الغربية ناقص حيث يحسب كل خط بأربعة دقائق والخمسة عشر خط تقدر بـ (60) دقيقة.

▪ التنين : "كوكبة"

تتجمع حول القطبية والدب الأصغر، وهي كوكبة مألوفة لأنها لا تغرب أبداً، فهي بمرأى منا في كل وقت من أوقات الليل ، وفي كل فصل من العام،

وعندما كان محور الأرض فيما مضى "5000 سنة" يتجه في اتجاه مخالف لاتجاهه اليوم ، كانت السماء تدور حول نقطة في كوكبة التنين .

▪ تি�خويراهي توفى عام 1601م

فلكي دنماركي انكب على رصد النجوم لكنه لم يتوصلا إلى اكتشاف النظام الكوني واعتقد أن الأرض في وسط النظام الشمسي، ويدور حولها القمر والشمس وأن عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل تدور حول الشمس . ونظامه هو :

- | | | | |
|-----------|-----------|------------|----------|
| 1) الأرض | 2) القمر | 3) الشمس | 4) عطارد |
| 5) الزهرة | 6) المريخ | 7) المشتري | 8) زحل . |

▪ التوقيت الصيفي

هو أجزاء يقدمون بمقتضاه الساعة ستين دقيقة في أشهر الصيف وذلك للتوفير في الطاقة الكهربائية .

وقد اتبعت هذا النظام لأول مرة إنجلترا عام 1916م أبان الحرب العالمية الأولى ، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1918 م .

▪ تابع

كوكب يتبع سيار ويدور حوله تبعاً لقوانين كبلر .

▪ تأجج الشمس

ظاهرة شمسية تسبب انبعاث الأشعة فوق البنفسجية من المنطقة المحيطة بالشمس وتؤثر على الأيونوسفير والمواصلات الراديوية .
تألين :

شكل أيونات من تفكك جزيئات أو من انتزاع الكترونات من الذرات أو من تجمع ذرات .

▪ تراجع

النجم الذي يتحرك في اتجاه مضاد للاتجاه المألف للأجرام المماثلة له .

▪ ترجاف

تدخل قوي جذب على حركة الجرم السماوي يؤدي إلى اضطراب حركته الدورانية النظامية .

▪ تقدم الاعتدالين

هو تقدم موحد الاعتدالين الربيعي والخريفي بسبب تقهقر النقطة الاعتدالية الناجم عن تقدم محور دوران الأرض في الفضاء .

▪ تريتون

أحد تابعي ثيتون مداره دائري مساره تراجمي .

▪ تقويم فلكي

نشرة تعطي جداول لإحداثيات الأجرام السماوية في حركتها في أوقات معينة وخلال مدة معينة .

▪ توأمان

كوكبة في البروج صورها المصريون بشكل جديين واليونان بشكل ولدين والعرب جعلوها أحياناً طاووسين أبرز نجومها رأس هرقل ورأس أفلون يسميهما العرب المقدم والمؤخر .

▪ التلاؤ

تغيرات سريعة في لمعان النجوم وفي ألوانها بسبب ظروف الرؤية .

▪ تنظيم

علم قيم يدرس تأثير البروج على المصير الإنسان وارتباط حياته بموعد ولادته .

• تلسكوب

كوكبة صغيرة في النصف الجنوبي من الكرة السماوية .

• التم

كوكبة في النصف الشمالي للكرة السماوية هي الدجاجة .

• التنين

كوكبة في منطقة البروج في النصف الجنوبي من الكرة السماوية بشكل أفعى رأسها تحت رجلي الجاثي وذبها الدب الأكبر والأصغر وتسمى الشجاع والحياة، وعدد نجومها 31 نجماً

• تيتان

تابع لزحل اكتشف عام 1655 يبعد عنه 1220 ألف كم يدور حول نفسه في 15 يوم و 22 سا و 30 د. قطره 4800 كم .

• تيئس

تابع زحل فوامه جليدي قطره 1000 كم يبعد عنه 295000 كم ، يدور حوله في يومين تقريباً .

مِنْذُ الْأَنْتَ

النائب الشعبي

كمية الطاقة الشمسية الساقطة في الثانية على المتر المربع المتعمد مع أشعة الشمس فوق الغلاف الجوي ، ويبلغ قيمة المعدل السنوي العام للثابت الشمسي كوكوب الأرض (1360) واط / م² .

三

قسم من المستويين قسمًا التي تت分成 إليها الدقيقة في قياسات الزاوية، ومن ثم فهي وحدة من وحدات قياس خطوط الطول أو العرض وتساوي $1/60$ من الدقيقة، وقدر الثانية العرضية بنحو (5,30) مترًا تقريبًا.

ثير موسفیر (الطیقة الحراریة)

الطبقة العليا عن الغلاف الجوي ويبلغ سمكها عدة مئات من الكيلومترات و تكون كثافة الهواء فيها قليلة جداً، ويصبح فيها الغلاف الجوي رفيراً وتوجد معظم الغازات في هذه الطبقة على شكل أيونات وبخاصة في الطبقة العليا منها، وهي الطبقة المتألية Ionosphere، وتعتمد درجة الحرارة في هذه الطبقة على شدة النشاطات الشمسية، ويمكن أن تبلغ درجة الحرارة 1500 س إذا كانت النشاطات الشمسية شديدة.

الثورة: "برج"

كوكبة تقع في البرج الثاني وبمثابة الجزء الأمامي من الثور، وتذكر الأساطير الإغريقية، أن زيوس أتخد هيئة الثور، أو أرسل ذلك الحيوان ليحمل يأفاق البحر إلى جزيرة كريت.

وبالكوكبة نجم عملاق أحمر هو الديران، كان يهندى به قديماً في الملاحة وبها عنقودان هما : الثريا والقلص .

• **ثاني أكسيد الكربون**

هو ناتج من عمليات التنفس والاحتراق والبراكين ، تقدر نسبته بحوالي 0,0318 % ويدخل في عملية التركيب الضوئي أضف إلى منعه الإشعاعات الحرارية من النفاذ من خلال الغلاف الجوي للأرض إلى طبقات الجو العليا فيحافظ بذلك جو الأرض على حرارته .

• **ثابت بن فرة**

أبو الحسن الحراني 826-901م. فلكي وعالم رياضيات عربي، أحد كبار المترجمين من اليونانية والسرقسطانية إلى العربية، وأشرف على ترجمة كتب أبوابولونيوس - أرخميدس - إقليدس - تيودوسيوس - بطليموس .

وجاليليوس وبيوتوكيوس وكانت قياساته للقطع المكافئ والأجسام الفراغية المتولدة عنه تتم عن ذكاء وله كتابات في الرياضيات والفالك والطب والتشريح، وله كتاب الذخيرة في الطب ونبغ من أبنائه إبراهيم وسانان والحراني نسبة إلى حران بلدة تقع حالياً في الأراضي التركية.

• **ثابت شمسي**

كمية الحرارة الشمسية على الطبقة الخارجية من جو الأرض وتبلغ 1.94 سعرًا غرامياً على 1 س م² في دقيقة واحدة .

• **ثاني أكسيد الكربون**

غاز ينجم عن اتحاد الكربون بالأوكسجين موجود في الهواء أو ذاتياً في الماء .

• **ثانية**

في الزمن 60/1 من الدقيقة .

في القياس 60/1 من دقة قوسية .

▪ ثريا

مجموعة من 6 نجوم ساطعة وآخر ضعيف موجودة في كوكبة الثور
ومجموعها 120 نجماً

▪ ثعبان

كوكبة جنوبية امتدادها كبير وألفا الثعبان يسمى الفرد قدره 2.2 .

▪ ثعبان البحر

كوكبة في النصف الجنوبي قرب القطب وتسمى الشجاع الصغير وحية الماء .

▪ الثعلب والوزة

كوكبة في النصف الشمالي بين الدلفين والنسر والدجاجة .

▪ الثمن صورة

نجوم جنوبية تحوي القطب الجنوبي وتقع فوق الطاروس والهندي .

▪ الثانية

هي النجوم الثانية أو المزدوجة وهي نجمان يدوران حول بعضهما أو
يدوران معاً حول مركز تقل مشترك .

▪ الثور

كوكبة شمالية نجومها كثيرة فيها الثريا والقلائص، أهم نجومها ألفا الثور : الدبران
وبيتا الثور : قرن الثور الشمالي، ويعرف منها 43 نجماً .

حروف اليون

"الجدي" : "برج"

كوكبة جنوبية في البرج العاشر ، بها المنزلة القمرية (سعد الذاي) ويطلق اسم مدار الجدي على أقصى دائرة عرض جنوبية على سطح الأرض، تتعامد عليها الشمس عندما تقع في ذلك البرج والكوكبة تقع بين كوكبي الدالي والقوس، ويمثلها القدماء بصورة جدي أو نصف جدي ذيله سمكة .

الجسم الأسود

الجسم المثالي ، الذي يشع ويمتص بكفاءة 100 % .

جغرافية الماضي أو (جغرافية العصور الماضية)

هو ذلك العلم الذي يدرس توزيع الماء والياس، بصفة خاصة، خلال العصور الجيولوجية المختلفة من تاريخ الأرض ولكنه يشمل أيضاً دراسة المناخات القديمة والأحياء البائدة أو أي ظواهرات جغرافية لزمن أو عصر جيولوجي، ومن أهم فروعه الحديثة (جغرافية البليستوسين) .

جيوفاني دومينيكو كاسييني

عالم فلكي إيطالي 826 - 901م اكتشف بالرصد أن الحلقة المحاطة بزحل والتي كشفها قبله الفلكي هوجين بأنها ليست حلقة واحدة وإنما هي حلقتان بينهما فراغ سمي بفراغ كاسييني تكريماً لهذا العالم، كما اكتشف معظم أقمار زحل وحدد بعد القمر عن الأرض، وقد كشفت المعلومات الحديثة أنه لا يوجد فراغ بسل هناك كثافة ضئيلة بين الحلقتين جعلهما تبدوان منفصلتين .

▪ جان أورت

فلكي هولندي عمل في الرصد للراديو "الإشعاعي" في مرصد لايدن في هولندا . اهتم برصد الإشعاعات القادمة من الكون البعيد، وأثبت أن مجرتنا درب التبانة أذرع ملقة حولها بشكل أقواس يعطيها شكلاً حلزونياً، واكتشف أن السحب تتدفع من محور المجرة بالتجاه أطرافها في سنة 1950 م أشار إلى وجود سحابة سديمية - نجمية عند أطراف مجرتنا على بعد 2 مليون سنة ضوئية تحوي ملايين المذنبات واعتبرها مصدراً للمذنبات وقد سميت باسمه .

▪ جوزيف لوبي لاغرانغ

فلكي فرنسي 1736-1813م أثبت أن لكل كوكب سيار نقطتي توازن في الفضاء أحدهما أمامه والثانية خلفية على مداره الذي يدور عليه وبأن بأرضنا نقطة توازن أمامية هي القمر ونقطة خلفية مؤلفة من غيوم باهته وقد أكد ذلك حديثاً الفلكي البولندي (كورديلوسكي) .

▪ جيمس كلارك ماكسويل

فلكي إسكتلندي 1831-1879م اكتشف الطاقة الحركية للغازات في الشمس والنجوم وبين حركتها كما أنه استنتج أن الحقل الكهرومغناطيسي (الكهربائي - المغناطيسي) يتحرك بسرعة الضوء 300 ألف كم/ثا، وأن الضوء هو إشعاع كهرومغناطيسي .

كما بين أن حلقات زحل مؤلفة من ذرات دقيقة وليس من كتل صلبة تتجمع بشكل حلقات .

▪ الجاثي

كوكبة في سماء النصف الشمالي شمالها التنين، وشرقيها النسر الواقع وجنوبها الحواء، وغربها الحبة، وهذه الكوكبة تتجه نحوها الشمس مع مجموعتها : ألفا الجاثي : رأس الجاثي ، وكلب الراعي وعدد منها الصوفي 29 نجماً .

- **الجانب نجم من الفرس الأعظم هو جنب الفرس أو غمـا الفرس الأعظم .**
- **جانوس**
تابع صغير لزحل اكتشف عام 1966 قوامه جليدي ويسمى (أوريبيتال) .
- **الجبار**
كوكبة في النصف الشمالي وتسمى أيضاً فرساوس أو برشاوش ، أو حامل رأس الغول .
- **الجدي**
كوكبة جنوبية وأهم كواكبها ، ألفا الجدي ، الجدي ، بيتا الجدي : الذابح غما : الناشرة، عدد نجومها 22 نجماً .
- **الجوزاء : (التوأمان)**
كوكبة استوائية من أجل كواكب السماء، ألفا الجوزاء : منكب الجوزاء تشتراك مع الجبار بكوكب بيتا الجوزاء : رجل الجوزاء اليسرى ، إيتا الجوزاء : سيف الجبار .
- **جونو**
كويكب بين المريخ والمشترى . اكتشفها علماء ألمان .
- **جمهرة هالية**
مجموعة نجوم قديمة في حالة المجرة .

هرف الماء

• الحوت : "برج"

كوكبة تقع تحت المرأة المسلسلة مباشرةً، ويمثلها الأقدمن بسمكتين بين ذيلها رباط، وهي تقع في البرج الثاني عشر، وكان تقهقر الاعتدالين سبباً في انتقال الاعتدال الريبيعي غرباً من كوكبة الحمل إلى الحوت .

وألمع نجوم الكوكبة نجم مزدوج .

• حجم الأرض

إن حجم الأرض يقدر بـ $1,083,207,000,000,000$ م³ .

• حزمة ضوئية متفرقة

وهي عبارة عن مجموعة من أشعة ضوئية تخرج من نقطة مضيئة ثم تبتعد عن بعضها كلما بعثت عن هذه النقطة ومن أمثلتها الأشعة التي تتفاوت من ثقب ضيق خلف جسم مضيء .

• حزمة ضوئية متوازية

وهي عبارة عن مجموعة من أشعة ضوئية متباينة ومتوازية مثل أشعة الشمس الساقطة على سطح الأرض، وفي الواقع فإن أشعة الشمس متفرقة ولكن تبعاً لبعد المسافة بين الشمس والأرض فإنها تعتبر أشعة متوازية .

• حزمة ضوئية متجمعة

وهي عبارة عن مجموعة من أشعة ضوئية تخرج من نقطة مضيئة ثم تقترب من بعضها كلما بعثت عن المصدر حتى تجتمع في نقطة واحدة، ومن أمثلتها الأشعة المتجمعة بعد مرورها من عدسة محدبة .

▪ **الحادي الحادي**

نجم من نجوم كوكبة العذار وهو العيون .

▪ **الحجر النيزكي أو الرجم**

حجارة وحصيات وزنها بين بضعة سنتيرامات وعدها أطنان تسقط من الفضاء على سطح الأرض محدثة ظاهرة ضوئية عند دخولها الغلاف الجوي الصغيرة منها تحرق تسمى الشهب والكبيرة تصمد إلى الأرض وتسمى نيازك .

▪ **الحرباء**

كوكبة جنوبية صغيرة تقع بين القطب والسفينة .

▪ **الحزمة**

كوكبة شمالية تسمى الذئبة، أو شعر برنيقة .

▪ **الحضيض الشمسي**

أقرب نقطة بين كوكب أو جرم سماوي إلى الشمس .

▪ **الحضيض القمري**

أقرب نقطة في مدار القمر خلال دورانه حول الأرض .

▪ **الحظيرة**

نجم هوابيلون السرطان يسمى الحمار الشمالي أو النثرة أو المعلف أو الدهاء .

▪ **الحلقة الماسية**

حلقة تظهر متألقة حول قرص الشمس قبل كسوف كامل أو بعده وتذوب ثوان قليلة .

• الحمام

كوكبة صغيرة جنوبية أسطع نجومها ، من القدر 2.8 ، اكتشفها روير 167 فيها 8 نجوم وتمثل قصة الحمام التي أطلقها نوح من سفينته .

• الحمل

كوكبة جنوبية في منطقة البروج بشكل خروف مانفت إلى الخلف وله قرنان كالكبش .

• الحواء

كوكبة استوائية بشكل رجل قائم يقبض على حية رأسها تحت الإكليل الشمالي وذنبها إلى العقارب .

• الحوت

كوكبة في منطقة البروج تشكل البرج الثاني عشر من بروج السماء، وهي بشكل سمكتين الأولى الحوت المقدم والثانية الحوت المؤخر .
ألفا الحوت : الرشا، بينما الحوت: فم السمكة

• الحوت الجنوبي

كوكبة جنوبية تجمها الرئيس فم الحوت من القدر 1.3 .


• الحية

كوكبة استوائية منظرها جميل تنتشر على مساحة واسعة من السماء تظهر كمنطقتين يفصل بينهما جزء من كوكبة الحواء 18 نجم .

حرف الفاء

• خط الاستواء

دائرة وهمية تحيط بسطح الكرة الأرضية في منتصف المسافة بين قطبي الأرض ويرمز لها بالنقطة صفر وتكون عليها أعلى درجات الحرارة .



• خط التوقيت الدولي

الخط الوهمي الذي يمثل خط الطول (180 غرباً) أو (180 شرقاً)، حيث يعتبر التوقيت بمعدل يوم واحد إلى الشرق أو الغرب بمجرد عبور هذا الخط، أو بما يعرف بخط غرينتش نسبة إلى ضاحية من ضواحي مدينة لندن .

▪ خط الزوال الشمسي

أو (الخط الهاجري) وهو الدائرة العظمى في القبة السماوية التي تمر بسمت الرأس للمكان والقطبين السماويين، فعندما تمر الشمس بهذه الدائرة يكون الوقت ظهراً تماماً أو الهاجرة في التوقيت المحلي .

▪ خط الهاجرة

أنظر (خط الزوال الشمسي) .

▪ خطوط الطول ودوائر العرض

هي عبارة عن شبكة من الخطوط المتقابلة على سطح الكره الأرضية بعضها دوائر متساوية البعد عن القطبين، سميت دوائر العرض وبعضها الآخر أنصاف دوائر سميت خطوط الطول يصل ما بين القطبين وتقيدنا خطوط الطول في معرفة الوقت أما دوائر العرض تقيدنا في معرفة المناخ والاثنان معاً يفيدنا في معرفة موقع الدولة سميت خطوط الطول .

▪ الخطوط الفلكية


مصطلح يقصد به خطوط الطول ودوائر العرض .

▪ خلية النحل

أو النثرة، جمع من النجوم يعرف بالثلثة أو خلية النحل، يمتاز بضوئه الساطع، ويقع في برج السرطان ، ولا يرى بالعين المجردة إلا كبقعة غير واضحة بين التوامين والأسد .

▪ بخسوف القمر

احتياج كل ضوء القمر أو جزء من ضوئه عن الأرض، وهذا لا يحدث كذلك إلا إذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر وعندما تكون مراكزهم على استقامة واحدة أي على خط زوال واحد.




▪ خسوف القمر الكلي

و فيه يختفي القمر تماماً، ولا يظهر بالنسبة للراصد على سطح الأرض.

▪ خسوف القمر الجزئي

ويحدث عندما يقع جزء من القمر في منطقة ظل الأرض، والجزء الآخر يقع في منطقة شبه الظل، فيرى الملاحظ أن الجزء الأخير مضيئاً، أما الجزء الآخر الذي يقع في منطقة الظل فيظهر مغناً .



▪ **الخباء**

كوكبة في النصف الجنوبي وهي الإكليل الجنوبي .

▪ **الخباء والخباء اليماني**

كوكبة صغيرة جنوبية هي الغراب .

▪ **الخروج**

خروج تابع من قرص سيار كخروج عطارد والزهرة من قرص الشمس .

▪ **الخسوف**

احتياط النور وفي القمر احتياط لسطحه (خسوف كلي) ، أو جزء منه (خسوف جزئي) عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس .

▪ **خطوط طفيفة**

خطوط تظهر على الميطاف تميز الجسم وتحدد مكوناته .

▪ **خط الاستواء السماوي**

دائرة كبيرة في الكرة السماوية تتعامد مع محور العالم وتستخدم معلمات للإحداثيات السماوية .

▪ **خط الزوال الفلكي**

دائرة عظمى في الكرة السماوية بين القطبين السماوين مارة بالسماء .

▪ **الخط الفاصل**

خط يفصل بين الجزء المنير والمظلم من قرص السمار في النظام الشمسي .

▪ **الخطم أو الخطام**

نجم في الدب الأكبر هو أوميكرون الدب الأكبر قرب القطب الشمالي .

▪ الخوار

نجم في الدب الأكبر هو زيتا الدب الأكبر يلتصق بثنا نعش من أسمائه
الصيدق والصيادوق .


حركة الدوال

▪ دائرة استواء السماء

الدائرة العظمى على القبة السماوية التي تنتج من تقاطع المستوى المار في خط الاستواء الأرضي مع الكرة السماوية .

▪ دائرة البروج


الدائرة العظمى على القبة السماوية التي تصنعها الشمس في أثناء حركتها نسبة للنجوم في عام كامل .



▪ دائرة الأفق

هي الدائرة العظمى على سطح القبة السماوية ، وتبعد عن كل من السمت والنظير مسافة زاوية قدرها 90° .

أن الراصد الواقف على القطب الشمالي الأرضي وسمته السنجق القطبي
قد اثراه الأفق له هي دائرة استواء السماء .
أما الراصد الواقف على خط الاستواء الأرضي فإن دائرة الأفق له هي
الدائرة العظمى المارة في القطبين السماويين الشمالي والجنوبي .




» دائرة زوال الراصد

هي الدائرة العظمى على سطح القبة السماوية التي تمر بالقطب الشمالي السماوي والسمت والنقطة الشمالية من الأفق وكذلك تمر بالقطب الجنوبي السماوي وللناظير والنقطة الجنوبية من الأفق .

الجزء الذي يقع فوق أفق الراصد يسمى منحنى الزوال، ويتعامد مع دائرة الأفق في النقطتين الشمالية والجنوبية من الأفق، ويمر في السمت والقطب الشمالي السماوي، ويقسم سماء الراصد دائماً إلى قسمين شرقي وغربي .


وتأتي أهمية دائرة الزوال، من أنها تحدد وقت منتصف النهار حين تمر الشمس فيها.

وبعد اثنى عشرة ساعة تمر الشمس في دائرة الزوال، لكن أسفل الأفق، ويحدد ذلك منتصف الليل.



■ دائرة استواء السماء

وهي الدائرة العظمى على سطح القبة السماوية، وتميل 90° عن القطبين السماويين : الشمالي والجنوبي، وتقسم القبة السماوية إلى نصفين : الشمالي والجنوبي، وهي ناتجة من امتداد مستوى دائرة الاستواء الأرضي مع القبة السماوية.



• دائرة الساعة


وهي الدائرة العظمى على سطح القبة السماوية التي تمر بالجسم السماوي، وبالقطبين السماويين، الشمالي والجنوبي .

• دائرة البروج

تحرك الشمس ظاهرياً على مدى سنة واحدة بالنسبة للنجوم على قبة السماء صانعة دائرة عظمى تعرف باسم دائرة البروج .

ومن ثم فإن دائرة البروج هي الدائرة العظمى التي تصلبها الشمس في حركتها الظاهرة حول الأرض على قبة السماء في أثناء سنة كاملة .

ويصنع مستوى دائرة البروج زاوية $23,4^{\circ}$ مع مستوى دائرة استواء السماء ، كما في الشكل ، وتنقاطع دائرة البروج مع دائرة استواء السماء في نقطتين تعرفان باسم نقطتي الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي .



• الدلو : " برج "

أو ساكن الماء أحد البروج الالثى عشر، تنزله الشمس في أواخر يناير كانون الثاني " وأوائل شباط "، وتقع فيه ثلاثة منازل للقمر، هي سعد السعد، وسعد بلع، وسعد الأخيبة، ولقد تخيل القدماء الكوكبة الواقعة في هذا البرج، وهي بنفس الاسم، رجل يسكن الماء من قدر .


• دورة النتروجين

النتروجين عنصر أساسى في تركيب البروتينات التي هي مركبات أساسية في بروتوبلازم الكائنات الحية، ويوجد في الغلاف الجوى بنسبة 78% من حجم الهواء " 76% كتلة " بشكل حر " N₂ "، كما أنه يوجد في التربة على شكل أملاح النترات " NO₂ "، وأملاح الامونيوم " NH₄⁺ "، وفي الغلاف الصخري في صخور تشيلي على شكل " NO₃ "، وفي الغلاف المائي على شكل " NO₃⁻ " . تعدد دوره النتروجين الموضحة في الشكل، أكثر تعقيداً من دوري الأكسجين والكربون، فهو لا يدخل في عمليتي التنفس والبناء الضوئي، إذ لا تستطيع الكائنات الحية " المنتجات والمستهلكات " الإفادة منه بشكل حر إلا إذا كان على شكل مركبات النترات أو مركبات الامونيوم الذائبة في الماء، والسبب في ذلك هو أن جزيء النتروجين يعد غير فاعل كيميائياً لاحتوائه على ثلاثة روابط " N = N = N " .

• الدب الأكبر

كوكبة شمالية واضحة في السماء أكثر نجومها تبقى ظاهرة ويسمى دليل السماء.

الفا الدب : الدبة، بيتا الدب : المراق تتألق من 27 نجماً سبعة منها يسميها العرب بنات نعش الكبرى.



▪ **الدب الأصغر**

كوكبة قرب القطب الشمالي الذي هو ألفا الدب الأصغر .
بيتا: الكوكب ، غما: الفرقد سبعة من نجومها يسميها العرب بنات نعش الصغرى .

▪ **الدجاجة (التم)**

كوكبة شمالية من خمسة نجوم رئيسية بشكل صليب شرق النسر الواقع . وعدد نجومها 50 نجماً .

▪ **الدلفين**

كوكبة صغيرة شمالية جنوب الدجاجة من 10 نجوم .
▪ **دائرة الكسوف**

(1) تعبر دائرة الكسوف عن المسار الظاهري للشمس في السماء خلال سنة (365'25 يوم)، والناتجة — أي دائرة الكسوف — عن دوران الأرض حولها —

أي حول الشمس — ودائرة الكسوف هي دائرة عظمى تقطع الكرة الأرضية في مركزها، وتميل على دائرة الاستواء بزاوية قدرها 23° .
وتعتبر دائرة الكسوف، بدائرة فلك الشمس .

(2) أو "دائرة فلك الشمس" وهي مدار الشمس الظاهري خلال السنة نتيجة لحركة دوران الأرض حولها، إذ هي دائرة كبرى في القبة السماوية .
فإذا عينا موقع الشمس يوماً بعد يوم مدة سنة كاملة بوساطة نقطة في كبد السماء — عند الظهر تماماً ، ثم وصلنا هذه النقطة بخط واحد نشأ من ذلك دائرة كبرى من دوائر الكرة السماوية هي "دائرة الكسوف" .
ومستوى هذه الدائرة مائل على مستوى دائرة الاستواء السماوية بزاوية قدرها 23.27° .

• الدلو

أحد البروج ترتيبه الحادي عشر صور بشكل إنسان يأخذى يديه إثناء يسكن منه الماء لذا سمي الساقى أو ساكب الماء يضم 45 نجماً .

• الدور الميتووني

دور قمري ينسب إلى ميتون اليوناني مدته 19 سنة شمسية = 235 شهراً
قمرياً وفيه يعود البدر والهلال في نهايته إلى اليوم ذاته .

• ديموس

تابع المريخ دورته 3 سا و 14 د يظل فوق الأفق الفريخي . مدة 64 سا
قطره 28×20 كم .

• ديونا

تابع صغير لزحل يبعد عنه 377 ألف كم.

• الدائرة القطبية الجنوبية

هي خط عرض 66.5 جنوباً .

وتبعاً لميل محور الأرض فان الشمس لا تغرب في منتصف الصيف الجنوبي (يوم 22 ديسمبر) وبنفس الصورة تجد أن الشمس لا تشرق في منتصف الشتاء الجنوبي (يوم 21 يونيو) .

وتزداد هذه الأيام (أيام عدد الشروق والغروب) داخل الدائرة القطبية الجنوبية كلما اقتربنا نحو القطب .

و تكون الأحوال عكس مثيلتها في أي وقت من السنة في " الدائرة القطبية الشمالية " .

• الدائرة القطبية الشمالية

هي خط عرض 66.5 شمالاً .

ونظراً لميل محور الأرض فان الشمس لا تغرب هنا في يوم من أيام السنة (حوالي 21 يونيو) وهو منتصف الصيف الشمالي ، بينما لا تشرق الشمس فوق الأفق يوم 22 ديسمبر تقريباً وهو منتصف الشتاء الشمالي .

ويزداد عدد مثل هذه الأيام كلما اقتربنا من القطب الشمالي حتى نصل إلى القطب نفسه فيصبح النهار ستة أشهر أيضاً .

وفي أي وقت من أوقات السنة تكون الأحوال في هذه المنطقة عكس مثيلتها تماماً في " الدائرة " القطبية الجنوبية .

• دائرة صغرى

دائرة على سطح الأرض لا تنصف الكرة الأرضية ، وهي بذلك تعني أي خط عرض او (دائرة عرض) غير خط الاستواء .

• دائرة عظمى

دائرة على سطح الأرض يمر مسواتها بالمركز ، ومن ثم فهـي تقـسـم الأرـض إلى نصفـين ، وـهـي في الواقع أي دائـرة يـصـنـعـها خطـانـ مـتـقـابـلـانـ من خطـوطـ الطـولـ .
كـماـ أنـ خطـ الـاسـتوـاءـ نـفـسـهـ يـعـدـ دائـرةـ عـظـمىـ كـذـلـكـ . وـيفـدـنـاـ هـذـاـ الـاصـطـلاحـ فيـ مـعـرـفـةـ أـنـ اـقـرـبـ مـسـافـةـ بـيـنـ أيـ نـقـطـيـنـ مـنـ سـطـحـ الـأـرـضـ هـيـ ذـاكـ القـوـسـ مـنـ الدـائـرـةـ العـظـمىـ التـيـ تـمـ بـهـماـ .

هرف الذال

▪ ذيل الفرس

سحاب من نوع السمحاق على شكل من الفشن .

▪ الذئب

نجم يقع في منطقة الطائر التي تحتوي على أجزاء كبيرة من كويكبات : العقاب والحيبة والحواء والرامي والسهم .
وهو أحد أجزاء المثلث البهي المكون من النجوم الثلاثة : النسر الطائر ، والنسر الواقع ، وأنف الدجاجة أو الذئب .

▪ ذات الربع(الربعية)


أخذت اسمها لكونها تمثل ربع الدائرة 90 آلة لقياس الارتفاع الزاوي ثم تطويرها من فكرة الإسطرلاب ويوجد منها شكل آخر لذات الربع الشمسي لقياس ارتفاع الشمس فوق الأفق .
أول من استعملها العرب .

▪ ذات الحق أو الم حلقة

آلية فلكية قديمة تتتألف من كرة وعدد من الحلقات المتحركة التي تمثل الدواير الرئيسية للكرة السماوية ، وفي المركز كرة صغيرة تمثل الأرض .

▪ ذات الربع الشمسية

جهاز يقيس الارتفاع الزاوي للشمس ومعرفة طول النهار وبه يمكن قياس ارتفاع الجبال والأبراج وقد عرفها العرب قبل الغرب واشتهر بصنعها الفلكي الدمشقي ابن الشاطر .



▪ ذات الحلق

آلة فلكية قديمة تتكون من مجموعة حلقات متراكبة تشكل كرة تظهر خطوط العرض ودائرة الكسوف .

▪ الذبابة

كوكبة صغيرة بين الرأس للغول والحمل كانت تدعى النحلة .

▪ الذراع الميسوطة

نجمان في التوأمين يشكلان المنزل السابع من منازل القمر الثمانية العشرين.

▪ ذنب الأسد

هو بيتاً الأسد ويسمى الصرفه المنزل 12 للقمر .

▪ الذئب

كوكبة جلوبيبة بمحاذاة قنطورس وتدعى الأسد .

▪ ذات الكرسي

كوكبة قرب القطب الشمالي أكثر من 55 درجةً بشكل امرأة جالسة على كرسي له قائمة كالمنبر ألفا : الصدر، بيتا : الكتف، دلتا : الركبة .

▪ الدوابة

كوكبة شمالية تتألف من 20 نجماً بين العذار والأسد ، والهلبة والحووض واللبلاط والكواره

▪ ذو الأعناء

كوكبة بين الثريا والدب الأكبر.

▪ الذئب

نجم ألفا التنين سماء العرب الذي (وهو ذكر الضبع) أخذه الأفرنج باسم الضبع ADIBA وتحول إلى ADIB .

عوف المرأة

• الرامي

أو القوس، كوكبة في البرج التاسع، تحل فيها الشمس قرب المذنب الصيفي، ويقع جزء منها في الطريق اللبناني، وتحتوي على كثير من السدم والعناقيد والنجوم المتغيرة، ويمثل الكوكبة مخلوق نصفه رجل ونصفه حصان ، وقد جذب قوسه لكي يطلق سهاماً، أما ثالثي نجوم هذه الكوكبة الامعة يسمى عرقوب الرامي .

• رودولف منكوفסקי

فلكي روسي الأصل عاش في الولايات المتحدة وعمل في مرصد بالومار، وقد اهتم برصد الإشعاعي (الراديوبي) وتوصل إلى معرفة أسرع المجرات انطلاقاً وله نظريات في شكل الكون وعمره وما يضممه من مجرات ودرس تطور المجرات والنجوم .

• رادار

جهاز يحدد وجود الشيء وموقعه باستخدام أصوات الموجات الراديوية .

• الرأس

يعني في الفلك النقطة التي تتجه إليها الشمس في مسارها في الفضاء .

• رأس الجاثي

هو نجم ألفا الجاثي ويسمى كلب الراعي .

• رأس الغول

هو بيتا فرساوس يتكون من نجمين أحدهما نير والآخر مظلم يدور حول نقل مشترك خلال 2 يو و 12 سا ويسمى الغول يبعد عنا 100 سنة ضوئية .

• الربيعة

آلية قديمة لقياس الارتفاع الزاوي وأسمها من كونها 90° رباع دائرة .

• الراقص

نجم في كوكبة التنين .

• راعي الشاء

هو العواء .

• الرامي والقوس

كوكبة هي البرج التاسع يعرف بواسطة خمسة نجوم بشكل قصة مقلوبة تسمى قصة اللين وهي جزء من الكوكبة نجومها كثيرة ، نجومها الظاهرة 31 نجماً .

• الرجل

هو نجم بيتا الجوزاء قدره 0.35 من أكثر النجوم سطوعاً في السماء يزيد ضياؤه الحقيقي على 15000 ضعف من ضياء الشمس .

• الرشا

نجم هو بطن الحوت وهو المنزل الثامن والعشرون من منازل القمر .

• ريا

أحد توابع زحل وهو كثلة ضخمة من الجليد، يبعد عن زحل 527 ألف كم.

عوْنَةُ الْرَّازِي

▪ ز حل ▪

اسم للكوكب من كواكب المجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس وهو غريب في شكله إذ تحيط به حلقة عريضة من الضوء تبدو كأنها ثلاثة أجزاء، تختلف قوة اللمعان في كل منها ويبلغ قطره نحو (71,000) ويبعد عن الشمس بمقدار (886) مليون ميل، وتتبعه تسعة أقمار، ويتم دورته حول الشمس سبع (9.5) سنة .

▪ الزمن الفلكي لميلاد كوكب الأرض

لا تفاصيل الفترة الزمنية التي ولد فيها كوكب الأرض بالمقاييس الزمنية الجيولوجية بل تبعاً لطولها العظيم تقدر بالمقاييس الفلكية، وتبعاً للدراسات الحديثة لحساب كمية النشاط الأشعاعي التي تتبع من الشمس و العلاقة بينهما وبين بقية كواكب المجموعة الشمسية أقمارها ورجح العلماء أن عمر كوكب الأرض يبلغ نحو 6 مليارات سنة.

وقد أستخرج العلماء الزمن البعيد الذي تكونت إبانه قشرة الأرض الخارجية باستخدام الساعة الذرية The Atomic Clock في قراءة تأثير فعل العناصر الطبيعية المشعة مثل اليورانيوم Uranium والثوريوم Thorium والربيديوم Radium والبوتاسيوم Potassium فقد تبين أن هذه العناصر تتحلل تلقائياً في الصخور القديمة بدرجات مقاومة وينجم عنها عناصر أخرى.

ويتحلّل مثل هذه المعادن وأيجاد النسبة بين اليورانيوم الموجودة، فإنه يمكن الوصول إلى معرفة الزمن الذي تكون الصخر خلاله، وبواسطة هذه الطريقة قدر عمر الجيولوجي لبعض صخور حقب ما قبل الكمبري من عدة مناطق مختلفة، وتكون بعضها منذ نحو 1850 مليون سنة.

كما تبين أن عمر صخور الجرانيت Shap granit في منطقة ليك ديسريكت Lake District بإنجلترا على أساس حساب كمية البوتاسيوم المماثلة في الصخور، تتراوح من 90 – 380 مليون سنة.

وأكملت نتائج دراسات علم الطبقات صحة هذا التقدير.

أما الصخور المتحولة في شرق الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتوي على معادن الزركون فتبين أن عمرها يبلغ نحو 1100 مليون سنة، بينما ذلك التي تحتوي على معادن البيوتيت Biotite عمرها نحو 300 مليون سنة، وعلى ذلك يمكن القول أن القشرة الخارجية للكوكب الأرض تكونت منذ نحو 4000 – 5000 مليون سنة على الأقل.

■ الزهرة

ثاني كوكب في بعد عن الشمس، ويقع بين عطارد والأرض، وهو ألمع جرم سماوي باستثناء الشمس والقمر، وأكثر الكواكب اقتراباً من الأرض، وله أوجه كالقمر، ويتغير حجم قرصه ويصغر إلا ما صار بدرأ، ويكبر وهو هلال، وذلك لبعده عنا في الحالة الأولى، واقترابه في الثانية .

ويبعد قطرها (7900) ميلاً، ويقرب حجمها من حجم الأرض، وتبعد عن الشمس بمقدار (68) مليون ميل وتدور حول الشمس كل (225) يوماً (حوالي ثمانية أشهر) وهي أيضاً لا ترى إلا قبل الشروق أو بعد الغروب .

■ الميزان

ألفا السرطان .

■ الزبانيان

نجمان في كوكبة الميزان هما ألفا وبيتا الميزان وهما المنزل 16 من منازل القمر .

• الزرافة

كوكبة شمالية بين الدب الأصغر والعنان .

• الزمان النجمي

الزمن المبني على أساس اليوم النجمي وطوله 23 ساعة و56.09 دو 4.09 ثا .
وهو الزمن من مشاهدة نجم بعيد عن الأرض إلى حين العودة إلى النقطة نفسها .

• زيتا الأسد

نجم في كوكبة الأسد يسمى الضفيرة، أو ضفيرة الأسد ومن أسمائه
الهلبة .

• الزيغ

كلمة فارسية الأصل تعني خيط الشاقول جمعها أزياج .
يشتمل على خطوط رأسية فيها وصف البروج ومقدار الميل ومسارات
الكواكب والتقويم وقياس الزمن وطول السنة والآلات الفلكية .

• زيحان دوبلي

في الفيزياط : زيحان خطوط الطيف لجسم مضيء نحو اللون الأحمر كلما
ابعد الجسم عن مكان تحليل الطيف .
استفيد منها في معرفة حركة النجوم والجرارات .

حروف العين

• الستار

نطق كروي يغلف لب الأرض ويقع بين فاصلين، فاصل وهو وهو الفاصل العلوي وفاصل خوتبرغ وهو الفاصل السفلي، وينقسم إلى أنطقه ثانوية، أعلى جزء منه سيكون مع القشرة الأرضية والغلاف الصخري، وهي طبقة صلبة وتحتها مباشرة توجد طبقة مائعة لها قابلية الانسياق، تسمى بالغلاف المائي، وتحتها مباشرة يقع الستار السفلي .

▪ ستراتوسفير (الغلاف الجوي الأعلى)

هي الطبقة التي تمتد من التروبوسفير حتى علو (5 كم) تقريباً وتشمل طبقة الهواء الجوي الحر، تمتاز هذه الطبقة بثبات درجة الحرارة مع الارتفاع في جزيئها السفلي وزيادة درجة الحرارة مع الارتفاع في جزيئها العلوي .

▪ السدم

جمع سديم وتعني السحابة أو الغمامـة، وقد أطلقها الفلكيون الأوائل على بقع واسعة من الضوء الغامض التي شاهدوها في السماء ، وتبين أنها سحابة هائلة من الغاز والغبار الكوني، تتخللها النجوم وتسمى " حاضنات النجوم "، وهي تمتد على مساحات واسعة من الفضاء، وهي أصل النجوم.


وقد وضع علماء الفلك لوائح لها أشهرها لائحة الفلكي شارل ميسية التي تحتوي على أكثر من 100 سديم .

وهناك أنواع من السدم :

1. سدم معتمة : سحابة من غبار كوني تمتضض ضوء النجوم القريبة وتحجز نور النجوم التي خلفها " سديم رأس الحصان " "
2. سدم بائنة : تكون نجومها شديدة الحرارة تجعل الهيدروجين يبorth كمية من النور مثل سديم ثلاثي الشعب وسديم الجوزاء M42 .
3. سدم عاكسة : نجومها آل حرارة مثل سديم " كيس الفحم " في كوكبة " نعيم " وتعكس نور النجوم المجاورة لها .


• السديم الباث

يوجد فيه نسبة كبيرة من الهيدروجين الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من نجم ساخن قريب، ونظرًا لأنها تقع تحت تأثير ضغط منخفض فهي تشع تلك الطاقة بشكل ضوء مرئي يسمى التلاؤ .




• السديم المظلم

يعشي السديم المظلم ضوء النجوم الموجودة خلفه والجسيمات الجامدة في السديم هي التي تمتضض الضوء ومثاله كيس الفحم في نعيم، والسدم المظلمة والعاتمة مناطق تتخفض فيها كثافة النجوم إلى الحدود الدنيا .



▪ سديم الانعكاس

وهو يعكس ضوء النجوم الموجودة بداخله أو بقربه، وتكون النجوم فيه أقل حرارة من مثيلاتها في النجوم الباثة .



▪ السفينة (كوكبة)

كوكبة تضم عدداً عظيماً من النجوم، ويطلق عليها اسم "أرجو" نسبة إلى السفينة التي قاد فيها البطل جاسون بحارته وراحوا يبحثون سدى عن الجزيرة الذهبية، كما تقول الأسطورة الإغريقية القديمة .

وكوكبة السفينة من الكبير بحيث تقسم عادة إلى ثلاثة كوكبات صغيرة هي الفرنية، والمؤخرة، والشرع .

■ سفن الفضاء

إذا كان حجم القمر الصناعي بحيث يتسع لاستيعاب مخلوقات حية يسمى سفينة الفضاء، ويصبح بحاجة إلى تجهيزات خاصة لتأمين الحياة كالسفن التي حملت غاغارين الروسي وشيرد الأمريكي ومحمد فارس مع زملائه الروس وتحتاج السفينة الفضائية إلى صواريخ ضخمة متعددة المراحل .

▪ السمت والنظير

تعرف النقطة الواقعة على قبة السماء، التي تكون رأساً فوق رأس الراصد وهو واقف، باسم السمت؛ في حين تعرف النقطة على قبة السماء المقابلة للسمت رأساً أسفل قدمي الراصد وهو واقف باسم النظير .

▪ السمت

النقطة الرئيسية على قبة السماء على امتداد الإنسان واقفاً إلى الأعلى، أو في علم الفلك نقطة يلتقي فيها الخط العمودي المنطبق من الأرض من الكورة السماوية .

▪ السمحاق

عبارة عن سحب توجد على ارتفاع عالي وتتألف من حبات ملتح وتشبه الريش في شكلها ولونها أبيض وليس لها ظل على سطح الأرض يدل وجودها على الجو الصحو، ولكن عند ازدياد سمكتها وكثافتها يدل على قرب حدوث جو رديء.



▪ السمحاق الركامي

هي سحب توجد على شكل قطع أو بقع بيضاء وفي مجموعات مع بعضها.



• **السمحاق الطبقي**

هي سحب توجد على شكل قناع أبيض تغطي السماء فيغير شكلها مثل اللين، وتحجب هذه السحب ضوء الشمس .

• **سنة كبيسة**

السنة التي تتتألف من (366) يوماً، وتأتي مرة كل أربع سنوات، وشهر شباط يأتي كل أربع سنوات (29) يوماً .

• **الساقي (ساكب الماء)**

كوكبة تسمى الدلو أو الساكي الماء وهي البرج الحادي عشر بين البروج .
أهم نجومها: ألفا وأوميكرون الساقي يسميها العرب سعد الملك .
بيتا وكسي الساقي : يسميها العرب سعد الأخبية لأنه يتوافق مع طيب الهواء وخروج الهوام التي كانت مختبئة بسبب البرد .
ابسيلون الساقي : سعد بلع وهو المنزل 23 من مدارل القمر .

• **الساهور**

في علم الفلك : دورة الخسوف والكسوف تتكرر كل 18 سنة و 10 يوم وثلاثة يوم عند عودة الأرض والشمس والقمر إلى وضع واحد .

▪ سحابة بروجية

سحابة من أجسام نيزكية تسبب الضوء البروجي .

▪ السدم الكوكبية

سدم تمثل مرحلة متأخرة من نطور النجوم تبدو كأفراد صغيرة أشهرها م 57، السيديم الحلقى في القبة كشف عام 1779 .

▪ السيديم

في علم الفلك هو كتلة من غازات أو نجوم مضيئة تنتشر كالغيمة بدون حدود واضحة في السماء، تنتج عن انفجار نجم وبقاء نواته وسحب غازية .

▪ السرطان

كوكبة في فلك البروج تقع حوالي 83 نجماً تتوسطها عدة نجوم مجتمعة سماها العرب النثرة، تمتد 37-7 شمال خط الاستواء السماوي .

▪ سرعة الإفلات

في الفيزياء : السرعة التي ينقطع فيها الجسم من جاذبية الأرض أو الكوكب السيارو. بالنسبة للأرض تبلغ 11.2 كم / ثانية .

▪ سرعة الضوء

المسافة التي يقطعها الضوء في وحدة زمنية وهي في الفراغ $300000 \text{كم} / \text{ثانية}$.

▪ سعد بالع (بلع)

نجم هو بيتا الساقى ويولف المنزل 23 من منازل القمر يتألف من إيسيلون / مو / نو الساقى .

▪ السفينة

كوكبة جنوبية فيها سهل أسطع نجومها ولا يفوقها إلا الشعري اليماني .

• **السهم**

كوكبة شمالية صغيرة 10° شمال خط الاستواء بين الدجاجة والنسر نصله إلى المشرق وفوقه إلى المغرب .

• **سهيل**

نجم ساطع في كوكبة برج السفينه وفي السماء الجنوبيه، وهناك عدة نجوم تحمل اسم سهيل .

• **السماك الراوح**

نجم هو ألفا العواء سماء العرب السمك لسموكه أي لارتفاعه قدره 0.2 طيفه لك صفر ، يبعد عن الأرض 41 سنة ضوئية ، ويسمى حارس السماء .

• **السيار**

جرم سماوي غير منير بذاته يدور حول نجم كالشمس أو غيرها .

• **السيارات الخارجية**

السيارات الموجودة خارج مدار الأرض، وتدور حول الشمس وهي : المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، ثيتون، بلوتو .

• **السيارات الداخلية**

السيارات الموجودة بين الأرض والشمس وتدور حول الشمس وهي : عطارد - والزهرة .

هرف الشرين

• شارل مسيبيه

فلكي فرنسي 1730-1817 م اهتم برصد المذنبات وال مجرات والسم و النجوم رصد 103 مجرة و سديم سمى أكثرها باسمه وتكريماً له يوضع الحرف M أمام المجرة كال مجرة M82 و M31 و.....

• الشجاع : " كوكبة "

كوكبة جنوبية، تقع أسفل كوكبات الغرائب والباطلية والعذراء والأسد والسرطان ويمثلها ثعبان طوبل مافو . وألمع نجوم هذه الكوكبة عنق الشجاع، وهو نجم مزدوج لا ترى أفراده إلا بالمنظار الفلكي .

• شهاب أو (شهب)

هي مواد صلبة أو إجرام سماوية صغيرة تدخل الغلاف الجوي العلوى من الفضاء الخارجي ، وترى من خلال توجهها الذي يسببه مقاومة الهواء لمسارها .

• شدة الضوء

ويقصد بها كمية الطاقة الضوئية الساقطة عموديا على وحدة المساحة في الثانية، وتؤثر شدة الضوء على معدل عملية البناء الضوئي في النباتات الخضراء، كما تؤثر على توزيع النباتات حسب البيئات المختلفة إذ إن بعضها يحتاج إلى ضوء شديد فينمو تحت الشمس الساطعة، وبعضها الآخر ينمو في الظل لأنه يحتاج إلى ضوء أقل، كما يؤثر الضوء على بعض العمليات الحيوية في النبات مثل عملية الانتحاء الضوئي، وعملية فتح الثغور في الأوراق وإغلاقها.

• الشبكة

كوكبة صغيرة على بعد 40 درجة تقريباً من القطب الجنوبي السماوي .

• الشجاع الأصغر

كوكبة جنوبية صغيرة قرب القطب الجنوبي بين الساعة والثمن .

• الشجاع

كوكبة جنوبية جنوب السرطان والسبنطة تجمها الرئيس ألفا الشجاع وعنقه وسهيل الفرد وسهيل الشام وفار الشجاع .

• الشفق

الفترة التي تلي الغروب وتنبثق الشروق وفيها تكون السماء غير مظلمة ويظهر الشفق الفلكي عندما تكون الشمس على أقل من 18° تحت الأفق، والسبب انتشار الأشعة الشمسية على نصف جزيئات الغلاف الجوي .

• الشفق القطبي

ضياء يظهر في الأفق قبيل طلوع الشمس بمقدار لا يتعدى ضوء القمر في الربع الأول وهي ظاهرة إشعاع ضوئي تحدث رفيا أعلى الجو حيث الضغط المنخفض والغازات وذئنة لوصول جسيمات مكهربة آتية من الشمس .

وتتأثر في القطبين بتأثير المجال المغناطيسي الأرضي في نصف الكرة الشمالي يسمى الشفق الشمالي يقابل الشفق الجنوبي .

يكثُر حصول هذه الظاهرة في فترات النشاط الشمسي القوي .

• شمس منتصف الليل

شمس المنظورة في منتصف الليل صيفاً في مناطق القطبين الشمالي والجنوبي، حيث يمتد طول النهار إلى 24 ساعة .

• الشهير النجمي

شهر فلكي طوله 27 يوماً و 7 ساعات و 43 دقيقة و 11.5 ثانية .

• الشواهد

كتلة غازية تتبع من جو الشمس الغازي وهي : ساكنة عندما ترتفع من الكروموسفير وتبقى طافية فوقه أو ثورانية عابرة ترتفع مئات الآلاف من الكيلومترات فوق سطح الشمس .

مِنْ ذَلِكُمْ

الضاروخ

فُزِيَّةً تدفع برد الفعل الناتج عن ابتكاق الغازات من فتحات خلفية منه.
عرف الصينيون الصواريخ منذ القرن الثالث عشر وفي العصور الحديثة
تطورها الأوروبيون.

استخدمها الغربيون في الحرب العالمية الثانية والألمان في الإغارة على لندن ومنذ منتصف القرن الحالي استخدمت الصواريخ في جمع المعلومات عن الكون وتطورت في عام 1949 ليصبح صاروخاً بمرحلتين ثم بثلاث مراحل فيما بعد .

وصارت الصواريخ تحمل الأقمار الصناعية والمركبات إلى مداراتها ومنها المستخدمة في أغراض الاتصالات وجمع المعلومات التجسس.

1. في أربعة تشرين 1957م إطلاق القمر الروسي سبوتنيك 1 باستخدام صاروخ من ثلاثة مراحل .

الصعود المستقيم

وهي الزاوية على قبة السماء، التي تقابل زاوية إحداثي الطول الجغرافي وهي الزاوية التي تصنعها الزاوية المارة بال重心 السماوي والقطبين السماويين مع نقطه الاعتدال الربيعي .

• الصليب الجنوبي : " كوكبة "

تقع في منطقة الصليب الجنوبي، التي تحتوي على كوكبتين هما قنطورس والصليب الجنوبي، ولما كان الصليب الجنوبي يحوي عدداً من النجوم الامعة في منطقة صغيرة نسبياً، اعتبر من مميزات السماء الجنوبيّة .

كما أن الدب الأكبر من مميزات الشماليّة، هذا والخط الطويل في الصليب الجنوبي يشير من ناحية إلى القطب الجنوبي ومن الناحية الأخرى إلى باب الغراب، عابراً قنطورس .

• صليب الجنوب

يسمى نعيم كوكبة جنوبيّة صغيرة لا يرى من نصف الكرة الشمالي لذا تأخرت معرفته حتى القرن 17 على يد روير 1679 .

• الصناج-الصياح

هو العواء .

• صباخد الشمس

يقع لامعاً تشاهد في فرصن الشمسي ترافق مجموعة الكاف الشمسيّة .

• صرار

أو " فالك " أو مسار أي جرم سماوي خلال الفضاء بالنسبة لنقطة معينة .

هوف الفضاء

• الضوء القرمزى

يكون ضوء الشمس عقب مغادرته لها وإثناء سريانه في الفضاء قبل التقائه بالأرض، مزيجاً من جميع الألوان التي يطلقها جو الأرض، هذا الفعل، فعل الجو في تحليل ضوء الشمس، يرجع إليه كثير من جمال الأرض، يرجع إليه زرقة السماء وشروع الشمس وغروبها، وألوان السحب عند الشروع والغروب، والضوء القرمزى الذي هو أبهى الألوان جمياً.

• الضغط الجوى

الضغط الحالى على سطح الأرض ويقاس بعمود زئبقي ارتفاعه 76 س م على سطح البحر ينخفض بالارتفاع عن سطح البحر ويزداد دون سطح البحر، ويعادل 1012 ميليبار.

• الضوء البروجى

شريط ضوئي خافت على طول فلك البروج يشتت لمعانه قرب الشمس ومقابل قرص الشمس ويسمى الوجه المضاد.

• ضوضاء الشمس

إشعاع كهروميسى ينبعث من جو الشمس ذبذباته تشبه ذبذبات موجات الراديو ،

هوف الطاء

• الطاقة الشمسية

هي الطاقة المتتجددة التي يحصل عليها الإنسان العادي عن طريق الحمامات الشمسية وباعتبارها المصدر المرشح للطاقة بعض احتياجات البشر على المدى القصير مع توفر إمكانات أن تنسع مساحتها في المستقبل بسبب أن المصادر الأخرى غالبة ومكلفة مادياً.

• الطبقى المرتفعة

هي عبارة عن السحب ذات لون رمادي أو ضارب إلى الزرقة وتوجد بها بقع تحجب أشعة الشمس .

• الطريق اللبناني

أو سكة البناء، منطقة عريضة تشبه طريقاً أبيضاً في السماء، يحتوي على عدد كبير من النجوم، فضلاً عن عدد من المجموعات الشمسية، المعروفة أن المجرة تدور حول محور عمودي على مستوى الطريق اللبناني ، في حوالي مائة مليون سنة ضوئية، ويوجد بها بضع مناطق مظلمة تسمى بالسدود المظلمة، تقسم الطريق اللبناني إلى جزئين لمسافة تبلغ ثلث أمتداده .

• الطبقى

هي عبارة عن سحب منخفضة رمانية اللون منتظمة تشبه الضباب لاتصل للأرض وتسقط منها قطرات من المطر الخفيف .

• الطاووس

كوكبة مولدة قريبة من القطب الجنوبي السماوي .

• طائر الطاووس

كوكبة جنوبية بين المثلث الجنوبي والقطب الجنوبي على بعد 20° من القطب الجنوبي

• الطرف

نجم هولمبا الأسد والطرفان عند العرب كوكبان يتقمان الجهة يشكلان علينا الأسد يتزلاهما القمر مدته 13 يوماً بين شهر آب وأيلول .

• الطغاؤة

في علم الفلك دائرة مضيئة تحيط بالشمس أو القمر أحياناً بسبب وجود غيوم جليدية في الجو الأرضي .

• الطنف

حافة قرص الشمس أو القمر أو أي جرم سماوي .

• الطوقان

كوكبة صغيرة مولدة في النصف الجنوبي فيها سديم غيمة ماجلان الصغرى تضم 12 نجماً . حدها الفلكي بيير عام 1603 .

• الطيف الومضي

طيف الحلقة الماسية يحيط بقرص الشمس قبيل كسوف أو بعد كسوف كامل لها وسمى ومضي لأن مدته ثوان معدودة .

• طيف الامتصاص

هو طيف إشعاع انتزع أحد ألوانه بامتصاصه من قبل غاز اعترض طريقه، شريطة أن يكون هذا الغاز قادرًا على إشعاع ذلك اللون - الذي امتص مرة أخرى فيما لو أشير .

حروف الفاء

• الظلمان

كوكبة جنوبية بين الاستواء والقطب نجومها ساطعة فيها نجم مزدوج هو رجل قنطروس ثالث أسطع نجم في السماء قدره 1.7-0.3 يبعد عنا 4.3 سنة ضوئية .

إضافة إلى عدد من النجوم .

• الظليم

نجم هوثيتا النهر يظن أن الصوفي رصده وسماه آخر النهر قدره الآن 0.6 وفترة طيفه بـ 5 يبعد عنا حوالي 73 سنة ضوئية .

هوك العين

▪ عطارد

هو أقرب الكواكب إلى الشمس، يبلغ طول قطره (2950) ميلاً يبعد عن الشمس بنحو (36) مليون ميل، ويمتاز بضوئه القوى لقرينه من الشمس ولا تستطيع رؤيته إلا بعد غروب أو قبيل شروق الشمس، ويدور عطارد حول الشمس في (88) يوماً .

▪ العقرب "برج"

تقع في البرج الثامن ، تشبه العقرب إلى حد ما، وفيها نجم عملاق أحمر هو قلب العقرب يرافقه نجم أخضر، وبالكوكبة ثلاثة منازل قمرية، هي الإكليل، والقلب، والشولة .

▪ عناقيد المجرات

تجمعات من المجرات مرتبطة جذرياً .

▪ العذارى

نجوم في كوكبة الكلب الأكبر في النصف الجنوبي وهي دلتا وإيسيلون وأيتا الكلب الأصغر .

▪ العذرة

أيتا الكلب الأكبر وهي كبرى العذارى .

▪ العذراء (السنبلة)

كوكبة من البروج على خط الاستواء وجنوبها تحوي مجموعة مجرات تسمى عناقيد العذراء وهي البرج السادس ، نجومها المرئية 32 نجماً .
ألفا العذراء وألفا العذرة هما السماسكان عند العرب السمك الأعزل والسماك الرامح .

▪ عرابيا

في الفلك، منطقة جرداء في المريخ يميل لونها إلى الصفرة .

▪ عرش قيصر

كوكبة جنوبية هي نعيم، (صليب الجنوب)

▪ العظاية

كوكبة شمالية بين يد المرأة المسلسلة شرقاً وذنب الدجاجة غرباً وبين يدي الفرس جنوباً ووراء قيفلوس شمالاً .

▪ العقاب (النسر)

كوكبة شمالية على تخوم درب التبانة مقسمة إلى ذراعين يشبهان جناحي العقاب .

▪ عقد الثريا

نجم أكثر نجوم الثريا ضياء قدره 3 هو إيتا الثور طيفه بـ 5 يبعد عنا حوالي 541 سنة ضوئية .

▪ العقدة

النقطة التي يتقاطع فيها فلك اليسار مع فلك البروج وإذا كان متقدماً من الجنوب إلى الشمال سميت العقدة الصاعدة أو الشمالية، وإذا كان من الشمال نحو الجنوب سميت العقدة النازلة أو الجنوبية أو عقدة الذنب أو الجنوبية .

▪ العقرب

كوكبة في فلك البروج تحوي علقودين متفتحين مـ 6 وـ 7 وهو البرج الثامن وهي غرب الميزان ونجموها 24 نجماً.

▪ علم الكواينات

هو العلم الذي يبحث في القوانين العامة الميسرة للكون وتكوين الأجرام السماوية ونظمها .

▪ علم الفلك الإشعاعي

أحد فروع علم الفلك تستخدم في الموجات الإشعاعية للتعرف على النجوم .

▪ العناز (ممسمك الأعنة)

كوكبة شمالية أكثر نجومها ضياء العيون ، يبتا العناز قطره 2000 مرة من قطر الشمس فيه عناقيد جميلة م 37 / م 36 .

▪ العناق

نجم هو غما المرأة المسلسلة قدره 2.3 وطيقه اك صفر ، يبعد عننا حوالي 300 سنة ضوئية .

▪ العنقاء

صورة نجمية لطير العنقاء الأسطوري يتتألف من 18 نجماً بين 40° - 60° جنوب خط الاستواء السماوي .

▪ العواء

كوكبة شمالية على امتداد الدب الأكبر نجومها الرئيس السمك الرامح، تتتألف من عدد من النجوم ألفا العواء : السمك الرامح .

▪ بيتا : البقار

▪ ابسيلون العواء : الإزار .

عدد نجومها 54 نجماً وهي بشكل صياد يمسك عنان كلبية استرييون وخراج (السلوقيين) يطارد بها الدب الأكبر .

العيوق

نجم ألفا العنار قدره 0.2 ومن اسمائه رقیب الثريا والحانی .

▪ غبار كوني

ذرات قرالية صغيرة تنشأ من احتراق الشهب بعد احتكاكها بالهواء، وتسقط هذه الذرات ببطء إلى سطح الأرض بفعل الجاذبية .

▪ غيش

الإقليم شبه القائم الذي يحيط بمنطقة الظل في حالة الخسوف، ويسقط منه بعض الضوء، كما يطلق الامصطلاح أيضاً على الأقاليم المشابهة التي تحتضن بالظل في البقع الشمسية .

▪ غروب

الوقت الذي تغيب فيه الشمس أو تغرب عن الأفق تبعاً لدوران الأرض حول محورها وتؤخذ لحظة الغروب عندما يقع الأفق على ملتقى قرص الشمس تماماً، ويختلف كل من الغروب والشروق باختلاف خطوط العرض وأحرف الشمس .

▪ الغلاف الجوي الخارجي

انظر "اكسوسفير" .

▪ الغلاف الجوي العظوي

هو النطاق الذي ينحصر بين "التربيوز" و "الاكسوسفير" انظر "ستراتوسفير" .

▪ الغلاف الحراري

بعد جهات الغلاف الجوي عن الأرض . Thermosphere

حرف الفاء

• فاصل خوتبرغ

هو الحد الفاصل بين السنار واللب ويصل معدل عمقه (2900 كم) تقريباً .

• فاصل موهو

هو الحد الفاصل بين القشرة الأرضية والسنار ، ويصل معدل عمقه (35 كم) .

• فصول فلكية

تمثل في فصول السنة الأربع : الربيع، الصيف، الخريف، والشتاء .

ونقسم السنة إلى فصول محددة على أساس تتابع حوادث الاعتدال الربيعي، والانقلاب الصيفي، والاعتدال الخريفي، والانقلاب الشتوي، في منطقة بين المدارية التي تبرز فيها تلك التتابعات .

• مصور الملاحة الجوية

هي عبارة عن خريطة طقس موقعه عليها الظواهر الجوية التي تهم الطيران في رحلته ؛ كالرؤية والغيوم، والرياح، والعواصف، ونموج الطقس السائد إلخ .

• الفرس الأعظم " كوكبة "

كوكبة شمالية تقع جنوب غربي المرأة المسلسلة، يمكن مشاهدة أربعة نجوم لامعة على هيئة مربع، ثلاثة منها تابعة، أما الرابع فهو المع نجم في المرأة المسلسلة، والمع نجم الفرس الأعظم هي، متن الفرس، ومنكب الفرس، وجناح الفرس، وبالكوكبة منزلتان قمريتان هما الفرع الأول والفرع الثاني .

• فصول

جمع فصل، ويقصد بها عادة الفصول الأربع من السنة (الشتاء ، والربيع ، والصيف ، والخريف) .

• فلك

1) علم الفلك ، أو علم دراسة الأجسام السماوية ، ومن فروعه " الجغرافية الفلكية " Astronomical Ceogr و تبحث في علاقة الأرض بالأجسام السماوية الأخرى ، وتسمى أحياناً " بالجغرافية الرياضية " Mathematical Ceogr فهي تدرس شكل وحجم وحركة الأرض وما إليها ، وهناك أيضاً علم الجيولوجيا الفلكية . Astronomic Geology

2) مدار أو مسار أي جرم سماوي خلال لفظاء .

• فلك الأرض

مدار أو مسار الأرض حول الشمس ، وهو مدار ينضوي تقريباً تحتل الشمس أحد مركزيه ، ومن ثم فإن الأرض تكون أقرب إلى الشمس في أحد الأوقات أو الفصول بينما تبعد عنها في الفصل المقابل ، وفي الحالة الأولى يقال أنها في " نقطة الرأس " وفي الحالة الثانية يقال أنها في " نقطة الذنب " .

• الفوتوسفير

خلاف جوي رقيق شفاف يكسو الشمس ويمثل الطبقة الجوية السفلية .

• فوهة نيزكية

حفرة على سطح الكواكب أو الأقمار ناتجة عن اصطدام نيزك .

• فيض الطاقة

هي كمية الطاقة التي تتنقل في أثناء وحدة الزمن عبر وحدة المساحة .

الفجر القطبي

ومن أهم ظواهر الجو العليا "الفجر القطبي" أو "الاورورا" ويسمى أيضاً الاهج القطبي، وأنوار الشمال والجنوب، ويشاهد في المناطق القريبة من القطبين على هيئة خيوط أو ستاير مضيئة تتدلى من السماء، ولذلك أطلق عليها اسم "الفجر القطبي" وللستائرألوان جذابة، تبدأ بحافة حمراء يتبعها لون اصفر.

وتشاهد هذه الظاهرة على ارتفاعات تمت من نحو 100 كيلو متر إلى 100 كيلو متر فوق سطح الأرض، ودل تحليل طيف الأضواء المنبعثة منها على وجود الأوكسجين والازوت على تلك الارتفاعات وعدم وجود الغازات الخفيفة مثل الهليوم والإيدروجين، ولعل السبب في ذلك سرعة افلات الغازات الخفيفة التي في أعلى الجو إلى الفضاء الكوني.

ويستطيع الذين يعيشون عند خطوط العرض التي تقارب خط 45 شمال خط الاستواء أن يروا ألوار الشمال نحو خمس عشرة مرة خلال العام ولكن جنوبى ذلك الخط لإنماح فرصة رؤيتها ورصدتها بهذه النسبة العالية حتى تكاد تعدم عند خط عرض 35 شمالاً والذين يعيشون شمال خط عرض 45 في مقدورهم أن يروا ألوار الشمال بكثرة خصوصاً في أواخر الخريف وأوائل الربيع .

والصور التي تظهر عليها هذه الأضواء متعددة لا حصر لها، وهي أحياناً لا تدعو الوجه الخافت في السماء الشمالي، ولكن كثيراً ما تظهر كقوس عظيم من الأنوار الخافتة، وتتنبأ بضياؤها ببطء كما تتبين عنها من أن إلى آخر ما هو على هيئة الأنوار الكاشفة وتمتد هذه الأنوار إلى سمت الرأس.

وقد يحدث أن يظهر الضوء على صورة ثوب عظيم من القماش ينتشر عبر السماء ، ويكتلى كالستائر الملفوفة التي تترنح ببطء في مهب الرياح مغيرة بذلك من أشكالها وألوانها ، وفي بعض الأحيان يملأ نور الفجر القطبي السماء بأكملها وفي

العادة يكون لون ستائر الفجر القطبي بين الأصفر والأخضر ، كما تكون لها حواف سفلية لونها بين الأحمر والوردي .

ولفظ الاورورا لاتيني الأصل يعني الفجر ، كما أن لفظ بوريالس لاتيني كذلك ويعني الشمال وعلى ذلك فان " لاورورا بوريالس " إنما تعني " فجر الشمال "، أما " الاورورا أو سترالس " وهي الضياء المماثلة التي تحدث في مناطق القطب الجنوبي ، فهي تعني " فجر الجنوب " ويشاهد الفجران معاً في آن واحد .

■ **الفترة الضوئية**

وتعرف بأنها طول فترة الإضاءة خلال اليوم الواحد، وتؤثر في الحالات

التالية

- .1 عملية الإزهار والإثمار في النباتات .
 - .2 انتهاء فترة السكون في ذبور بعض النباتات .
 - .3 هجرة الطيور من بيئتها إلى أخرى بهدف التكاثر .
4. السلوك اليومي للحيوانات ، فبعضها ينشط نهاراً بعد نومه ليلاً وبعضها الآخر ينشط ليلاً بعد نومه نهاراً ، ففي جسم كل منها ساعة بيولوجية مرتبطة بالفترة الضوئية وشذتها .

■ **الفرس الأصفر**

كوكبة شمالية هي قطعة الفرس :

■ **الفرس الأعظم**

كوكبة شمالية قرب المرأة المسلسلة شرقها عنقود كروي م 15 تظهر فيها أربعة نجوم بشكل مربع: المركب - الساق - الجنب - السرة

▪ فرساوس

كوكبة شمالية شرق ذات الكرسي فيها الغول والعنقود الكروي م 34،
بشكل رجل لابس خوذة بيده اليمنى سيف وفي اليسرى رأس غول 0

▪ الفرقد

نجم هو غما الدب الأصغر ويسمى أيضاً أخفى الفرقدان 0

▪ الفرود: (القرود)

أربعة نجوم في خط مستقيم يسمى النسق جموعها 9 نجوم اثنان منها في الكلب الأكبر وسبعة في الحمامه .

▪ فستا

كوكبة بين المريخ والمشتري اكتشفها الألمان عام 1807 قطرها 538 كم .

▪ الفكة

نجم هو ألفا الإكليل الشمالي .

▪ فلك البروج

دائرة كبيرة سماوية تمثل حركة الشمس الظاهرية في مدة سنة، أو ترسمها الأرض في حركتها الحقيقة حول الشمس وتتألف من 12 برجاً .

▪ فلك التدوير

دائرة صغيرة مركزها في محيط دائرة كبيرة .

▪ الفرسخ النجمي

مسافة مدارها ثانية من القوس وتساوي 3.26 سنة ضوئية .

حافة القاف

• القارة

موقع من الكره الأرضية (اليابس) يشكل (29 %) من مساحة الكره الأرضية .

• القدر الظاهري للنجم

قيمة عدديه تعبر عن اللمعان الظاهري للنجم بالنسبة لغيره من النجوم .

• القشرة الأرضية

هي الطبقة الخارجية التي تتربك من الصخور التي تحيط بالكرة الأرضية، وبلغ حكمها حوالي أربعين كيلومتراً، وتسما بالقشرة السطحية للأرض كما تبلغ كثافتها (3 كم) .

أو هي نطاق كروي يغلف الستار، وتكون الجزء العلوي من الغلاف الصخري ويصل معدل كثافة (2,7 - 2,9 غ / سم³) وسمكه يتراوح من (5 كم) تحت المحيطات إلى (40 كم) تحت القارات .

• قشرة جيرية

في التربة وهي الطبقة التي المتماسكة بفعل كربونات الكالسيوم أنظر (أنظر قشرة صلبة) .

• القبة السماوية

قبة لانهائيّة يقع مركّزها في أيّ مكان من المجموعة الشمسيّة، ولكن ينخذ مركز الأرض غالباً مركزاً تُسقط منه كلّ أفراد المجموعة الشمسيّة .

• قطر الكرة

المستقيم الوهمي الذي يمرّ بمركز الأرض وينتهي بنقطتين على سطحها .

• قوس قزح

قوس دائري من ألوان الطيف يشاهد عندما تسقط أشعة الشمس على المطر، ويحدث نتيجة لانعكاس وانكسار الضوء في قطرات الماء ، ففي طرف "القوس الأساسي" يظهر اللون الأحمر، بينما يظهر اللون البنفسجي في الداخل . وقد يحدث أحياناً أن ينكسر بعض الضوء الساقط على قطرات الماء انعكاسين بدلاً من انعكاس واحد، ومن ثم يتكون "قوس ثانوي" أو "قوس خارجي" وفي هذه الحال يكون ترتيب الألوان عكس ترتيبها في القوس الأساسي كما تكون أقلّ وضوحاً، وتقدّر زاوية مجال القوس الأول أو "الأساسي" بنحو 42° ، بينما تزيد زاوية مجال القوس "الثانوي" أو "الخارجي" عن 54° .

أو ظاهرة طبيعية تحدث في الأفق المقابل للشمس في الشتاء، وتحدث بفعل تحلّل ضوء الشمس في قطرات الماء، وحدوث انعكاسات كثيرة داخلية فيها .

• قشرة حديدية

طبقة صلبة صماء توجد عادة في المناطق الرملية الحصوية تحت السطح لمسافة بسيطة وتعزي صلابتها إلى تسرّب أملاح الحديد من الطبقات العليا وترسبها على هيئة أكسيد الحديد المائة في الطبقات السفلية انظر (قشرة صلبة).

▪قطبية السماوية

نقطة التقائه الخط الواصل بين القطبين الجغرافيين الشمالي والجنوبي مع الكرة السماوية .

▪قطبية مغناطيسية مقلوبة

قطبية الصخور التي تكون معدنها المغناطيسية ذات اتجاه معاكس لاتجاه المجال المغناطيسي الأرض الحالي .

▪قوانين كبلر

ثلاثة قوانين تصف حركة الكواكب حول الشمس .

▪فوة كوريوليس

فوة تؤثر في الرياح والأجسام المتحركة في منطقة الغلاف الجوي وعلى سطح الأرض تؤدي إلى تغير طفيف في اتجاهها وتتتج من دوران الأرض .

▪القيمة الحرارية للوقود

كمية الطاقة الناتجة من حرق غرام واحدة من مادة الوقود حرفاً تماماً في كمية كافية من الأكسجين .

▪قسطورس "كوكبة"

كوكبة ضوئية، بها ثالث نجم لامع في السماء، وهو رجل قسطورس الأول الشعري اليماني، والثاني سهيل .

وبالكوكبة أقرب نجمتين إلى المجموعة الشمسية هما : رجل قسطورس، والأقرب القطوري .

يعتبر القمر جسماً كروياً مثل الأرض ولكنه أصغر منها، حيث لا يتجاوز قطره الاستوائي 25% قطر الأرض، حيث يبلغ قطر القمر عند خط استوائه 3476 كم، أي قرابة 0,27 كم من قطر الأرض .

والقمر يبعد عن الأرض بما يقرب من 384 ألف كم، وقد وجد أن متوسط كثافته تبلغ $3,5 \text{ غ}/\text{سم}^3$ ، أي أقل قليلاً من متوسط كثافة الأرض البالغة $5,52 \text{ غ}/\text{سم}^3$ ويدور القمر حول الأرض من الغرب إلى الشرق أي باتجاه دوران الأرض حول نفسها، ويتم دورة كاملة خلال فترة 29,5 يوماً.

وهذه الفترة عبارة عن الشهر القمري "المهجري" ولهذا السبب نجد عدد أيام الشهور الهجرية أحياناً 29 يوماً وأحياناً 30 يوماً.

ويرتبط بالأرض بقوة الجاذبية المتبادلة بينهما لذا فإنه يدور حولها في مدار إهليجي.

أوجه القمر: يدور القمر حول نفسه كل 27 يوماً و7,5 ساعة تقريباً، وإثناء دورانه حول الأرض يكون أحد جانبيه مفتوحاً لها بشكل دائم.

أما الجانب الآخر فلا يمكن رؤيته من الأرض، ولكن أمكن تصويره من مركبات الفضاء، لقد كان يوم 21 تموز / يوليو 1969م يوماً حاسماً في العالم، إذ وطأت قدم أول إنسان على القمر وهو نيل أرمسترونج وزميله دون الدوين.

وتبيّن أن سطح القمر مكسوا بالغبار والرماد ويخطي سطحه آلاف الفوهات البركانية التي توجد في وسط بعضها قمم جبلية منعزلة.

ويوجد على سطح القمر سلسل جبلي يصل ارتفاع بعضها إلى 9000م وهو بعد أكبر ارتفاعاً من الجبال على سطح الأرض.

وباستمرار تحرك القمر حول الأرض تستطيع رؤية جزء من سطح القمر المضيء، فبعد طور المحاق نراه على شكل هلال رفيع جهة الغرب بعد غروب الشمس مباشرةً.


وبعد أسبوع من طور المحاق نرى نصف قرص القمر المواجه لنا ماضياً، ويطلق على طور القمر في هذه الحالة الترتيب الأول . وبعد أسبوعين من المحاق، أي في منتصف الشهر القمري، نرى سطح القمر المواجه لنا ماضياً بأكمله، ويطلق على طور القمر في هذه الحالة البدر .

وبعدها تبدأ المساحة المضاءة من سطح القمر بالتناقص تدريجياً، إلى أن يصبح تدريجياً أخيراً بعد ثلاثة أسابيع ثم يعود ليصبح ملائماً بعد أربعة أسابيع، وبهذا تكتمل دورة القمر الشهرية، فيبدأ بعدها دورة جديدة له حول الأرض .

« قياس بعد النجوم »

لم تكن عند الأقدمين فكرة حقيقة عن بعد النجوم فقد ظن الإنسان قديماً أن قطر الشمس لا يتجاوز 70 س.م، واليوم تتبع عدة طرائق لقياس أبعادها منها :
 1. يقال الإغريقي أريستاخوس قبل 3 ق. م كان يعتقد أن الشمس هي مركز الكون قبل أن يضع كوبرنيكوس نظريته، وأنه توصل إلى قياس المسافتين النسبتين بين الأرض والشمس وبين الشمس والقمر معتمداً على أن القمر في الربع الأول يشكل مع الشمس زاوية قائمة فقلس ارتفاع الشمس في ذلك اليوم ومنها خرج بمثلث عرف منه زاويتان إلا أن قياسه كان للزاوية 87° بينما هي في الواقع $89,52$ وكانت النسبة عنده

$$\frac{1}{390} \quad \text{بينما هي في الواقع} \quad \frac{1}{190}$$




2. القياس بوساطة انتزاع النجم :

وفيه يتم رصد نجم قريب من موقعين متشابلين في الأرض (يومين الانقلابين الصيفي والشتوي) فيبدو النجم قد انزاح، وبمعرفة المسافة بين مواقع الأرض والبالغة 300 مليون كم والزاوية ز "زاوية الانزياح" يمكن تقدير بعد النجم، (إلا أن الطريقة تصلح لقياس المسافات القرية إذ أن أقرب نجم لا يتجاوز الزاوية $\frac{1}{60}$ دقيقة من الدرجة ، أي

1 من الدرجة .


3. القياس بالقدر النجمي :

تعتمد الطريقة على مبدأ الفرق بين القدر الظاهري والقدر الحقيقي للنجم، فإذا بعد متبع ضوئي عن الراسد إلى ضعف مسافته فإن لمعانه ينخفض إلى ربع قيمته وإذا بعد أربع أمثال المسافة فإن لمعانه ينخفض إلى 1 على 16 من القيمة الأصلية لمعانه وبمقارنته الفرق بين القدر الحقيقي والقدر الظاهري يمكن معرفة بعد هذا النجم وبالمقارنة بين لمعان نجم بعده معروف "بالإنحراف الظاهري" مع لمعان نجم بعيد يمكن تقدير بعد النجم الجديد .



• القائد

نجم هوأيتا الدب الأكبر واسمه قائد بنات نعش .



• قبلة الشمس

النقطة التي تندفع نحوها المجموعة الشمسية بسرعة 20 كم /ث ، وهي كوكبة الجاثي .

• قبلة الشمس المضادة

النقطة المقابلة لقبلة الشمس .

• القدر

لمعان النجم وفيه القدر الأول هو لمعان شمعة صغيرة على بعد 400 م ويتناقص حتى القدر 20 بنسبة قوة 2.5 .

القدر الأول يساوي مائة مرة من القدر السادس وما زاد عن القدر الأول يمثل بقوة سالبة - 1 ، - 2 ويمكن مشاهدة النجوم بالعين المجردة حتى القدر السادس .

• القدر الظاهر

هو قيمة يتميز بها ضياء ضياء الجرم كما تراه العين وكلما كان الجرم أكثر ضياء يصغر العدد الذي يشير إليه، فالقدر الأول أكثر ضياء من الثاني وهكذا .

• القزم الأبيض

نجم يتكون من مواد متحللة صغير الحجم كثافة كبيرة جداً حوالي مليون مرة كثافة الماء لا توجد فيه طاقة نووية .

• القبة

كوكبة في النصف الجنوبي هي الإكليل الجنوبي .

• القلانص

نجوم بشكل 7 في كوكبة الثور منها الدبران بشكل عنقود متفتح، عدد نجومها 100 نجم .

• الطبان السماويان الاستوائيان

تعرف النقطة الواقعة على القبة السماوية، على امتداد الخط الواصل بين مركز الكرة الأرضية والقطب الشمالي الأرضي باسم القطب الشمالي السماوي .

وتعرف النقطة الواقعة على القبة السماوية على امتداد الخط الواصل بين مركز الكرة الأرضية والقطب الأرضي الجنوبي باسم القطب الجنوبي السماوي، ويشار إلى القطب السماوي الاستوائي الشمالي بدلالة النجم القطبي . Polaris

• قلب الأسد

نجم، ألفا الأسد وهو العشرون بين أكثر النجوم ضياء في السماء، قدره 1.35 وطيقه ب 8 يبعد عنا 67 سنة ضوئية .

▪ قلب العقرب

نجم، ألفا قدره 2 ، طيفه م $3\lambda + 1$ ويسمى نير العقرب، قطره 400 مرة قطر الشمس .

يبعد عنها 250 سنة ضوئية .

▪ قلب النحات

كوكبة صغيرة جنوبية نجومها خافتة الضوء .

▪ القيثارة : (الشلياق)

كوكبة شمالية صغيرة بين الجاثي والدجاجة .

ألفا القيثارة : النسر الواقع .

بيتا القيثارة : الشلياق .

غاما القيثارة : السلحفاة .

إيتا القيثارة : الأظفار .

ألفا وايسيلون وزيتا : الأثافي .

▪ قيطس الحوت

كوكبة جنوبية تسمى أيضاً سبع البحر بشكل حيوان بحري مقدمته جهة شرق جنوب الحمل ومؤخره في الغرب قرب الدلو تمتد على مساحة كبيرة أكبر من جميع الكويكبات .

▪ متغيرات قيقاوية

نجوم متغيرة الإضاءة، تلمع وتختبئ بشكل دوري بمدة تتراوح بين ساعات 100 يوم .

هوف الكاف

• الكرة الأرضية

من المألوف أن تطلق لفظ الكرة الأرضية أو الأرض على الكوكب الذي نسكنه، سواء منه اليابس أو الماء أو ما يحيط بهما من الهواء، ويمكن تقسيم الأرض طبيعياً إلى أربعة أجزاء كما هو في الشكل الوارد أمامك وهي :

1. الهواء أو الغلاف الجوي .
2. الماء أو الغلاف المائي .
3. اليابس وهي التشرة الأرضية أو المتحجرة .
4. جوف الأرض أو جسم الأرض الداخلي .

أو نموذج صور الأرض دون تشويه شكلها وهي أكثر دقة لتشابهها من كوكب الأرض فهي تطبق الحقيقة إلى حد كبير من جهة التمثال .

• الكرة السماوية

الكرة التي تبدو الإجرام السماوية تتحرك عليها يومياً حول الأرض، نتيجة دوران الأرض حول محورها .

• الكروموسفير

غلاف جوي شفاف يحيط بطبقة الفوتوسفير في الشمس ويمثل الطبقة الجوية الوسطى .

• الكسوف

ظاهرة طبيعية تحدث للشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، وتكون جميعها على خط مستقيم واحد، ويكون كسوف الشمس كلياً في الأماكن التي يقع عليها ظل القمر وجزئياً في الأماكن التي تقع في منطقة شبه الظل .

▪ كسوف الشمس الكلي

ويحدث بالنسبة للجزء الذي يقع في منطقة ظل القمر، وتختفي فيه الشمس عن الرأصد تماماً.

▪ كسوف الشمس الجزئي

ويحدث بالنسبة لأجزاء الأرض التي تقع في منطقة شبه الظل، وفيه يلاحظ الرأصد جزءاً من الشمس ويحتجز بقية جسم الشمس خلف القمر.

▪ كسوف الشمس الحلقي

ويحدث في أجزاء الأرض التي تقع في امتداد مخروط ظل القمر، وتظهر الشمس للرأصد على شكل قرص مظلم تحيط به حلقة مضيئة .

▪ الكأس

كوكبة جنوبية جنوب برجي الأسد والستبنة كوكب منها مشترك بينها وبين الشجاع وتسمى باطنية .

▪ الكبش (الحمل)

كوكبة جنوبية في منطقة البروج يذكر كأول برج عند تعدادها .

▪ كرسى المصور

كوكبة جنوبية مولدة فيها عدد قليل من النجوم الضعيفة .

▪ كرسى النحات

كوكبة جنوبية مولدة بين الكركي والعنقاء .

▪ الكركي

كوكبة جنوبية مولدة بشكل طائر ميسوط الجناحين قريب من الدلو والجندى فيها 24 نجماً .

• الكلب الأصغر

كوكبة شمالية قرب خط الاستواء نجمها الرئيس الغميساء قدره 0.5 .

• الكلب الأكبر

كوكبة جنوبية تحت الجبار على حافة درب التبانة، نجمها الرئيس ألفا الكلب الجبار أو الشعري اليمانية -أسطع نجوم السماء ضياءً وقدرها الظاهري - 1.4 .

• كوارة

كوكبة شمالية هي الدوابة وتشتت الليلات .

• الكور

كوكبة صغيرة جنوبية بين فيطس والنهار .

• الكوكبة

مجموعة من النجوم الثابتة متقاربة يطلق عليها اصطلاح معين، تجمع كل كوكبة عدداً معيناً منها، جمعت في 88 كوكبة .

• الكويكبات الظرفادية

مجموعة سيارات صغيرة في الفجوة بين المريخ والمشتري وهي مجموعتان واحدة على 60° وراء المشتري وأخرى على 60° أمامه .

• كيس الفحم

سديم بشكل كثلة هائلة من الغبار والغاز ، تمنع ضوء النجوم من النفاذ، وتقع في كوكبة الصليب الجنوبي .

• الكوازارات

مفردها كوازار QUASAR وهو اختصار لعبارة انجليزية QUASISTALLAR RDIO SOURCES ومعناها المصادر الراديوية نصف النجمية اقترح اسمها الفلكي هونغ بي شو سنة 1964، تبعد عن اآلاف ملايين السنين الضوئية .

• الكواكب الأرضية

أربعة من الكواكب الشمسية الأقرب إلى الشمس، وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، وتشبه الأرض بشكل عام من حيث التركيب والحجم .

• الكواكب الداخلية

كواكب لها لب معدني حوله ستار صخري وقشرة صخرية ويحيط بها غلاف جوي .

• كوكب خارجي

كواكب لها لب صخري صغير نسبياً وتكون من غازات أهمها الهيدروجين والهيليوم .

• كوبر نيكوس 1473 – 1543 م

يُنسب النظام إلى العالم كوبر نيكوس الذي وضعه بعد أرصاد لمدة 30 عاماً وفيه وضع الشمس في مركز العالم .

والمعروف أن علماء اليونان مثل فيثاغورث 572 – 417 ق.م . وأريستاخوس 310 – 230 ق.م . والعالم العربي ابن الشاطر قالوا بثبوت الشمس ودوران الكواكب حولها ولكن كوبر نيكوس شرحه إلا أنه لم يتخلف عن فكرة أن لكل سيار حركة دائرية خاصة .

وضع نظريته عام 1530م وجعل الشمس مركزاً للعالم ودام الاضطهاد الديني لنظريته فترة من الزمن ولم تنشر نظريته إلا قبيل وفاته في عام 1543م .
والنظام الكوبرنيكي :

- (1) الشمس (2) عطارد (3) الزهرة (4) الأرض .
(5) المريخ (6) المشتري (7) زحل .

• الكون

هو جميع الفضاء الذي حولنا وما يحتويه من مادة (نجوم وأجرام وكواكب واقمار ... الخ) وطاقة .

أو هو كل ما يوجد في قبة السماء من أجرام سماوية، ونحن نعلم أن فكرة السماء لا وجود لها في الواقع، وإنما هذا اللون الأزرق الذي نراه، هو اللون الوحيد الذي ثبقي، بعد أن ينحل ضوء الشمس في الجو (ضوء الشمس يشمل ألوان الطيف المعروفة) .

وإذا نظرت إلى السماء فستجد الملايين من الأجرام السماوية، بعضها ضوء ثابت، وبعضها الآخر ضوء متلائئ أو متحرك.

والضوء الثابت ينبع من الكواكب Planets ، أما المتلائئ فينبع من النجوم Stars .

والنجوم عبارة عن شموس تختلف في الحجم كما يختلف بعدها عنا بمتات الملايين من الأميال.

ولقد كان علماء الفلك القدماء يقتصرن في أحاثهم على الكرة الأرضية و المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها. ولكن علماء الفلك في العصر الحديث استطاعوا - بما لديهم من ميكروس코بات قوية عظيمة - أن يكتشفوا في الفضاء أكوانا أخرى عديدة، يتبع بعضها عن بعض تباعد الجزر وسط المحيط العظيم،

حتى يقال أن هناك ملايين من الأكوان الأخرى، غير الكون الذي ننتمي إليه. وهي أكوان صغيرة ينفصل بعضها عن بعض، وتبعد في الفضاء، وتظهر هذه الأكوان على هيئة سلم متفرقة وموزعة توزيعاً عادلاً في الفضاء.

• الكويكبات

عبارة عن أجسام كونية صغيرة الحجم، هائلة العدد وتتجمع فيما بين مدارات المشتري والمريخ، ورجح كثيرون من الفلكيين بأن هذه الأجسام ما هي إلا حطام كوكب كبير، أو بقايا عدة كواكب كانت موجودة من قبل ثم تعرضت للانفجار وتطاير وتناشرت أجسامها ، ولا يقل عدد الكويكبات الكبيرة الحجم نسبياً عن 1500 كويكب، وأكبها حجماً كويكب سيرس الذي يبلغ نصف قطره 770كم، في حين يقل حجم بعضها الآخر عن حجم كرة القدم .

• الكورونا

الغلاف الجوي الخارجي للشمس وهو شفاف ويحيط بطيبة الكروموسفير .

• كلاب الصيد " كوكبة "

تقع كلها تقريباً في منطقة 5، وهي تحتوي النجم المزدوج ألف كلاب الصيد، الذي يمكن تعبينه في السماء برسم خط من ألف الدب الأكبر إلى جيمه، ثم مده إلى مثل طوله مرة ونصف مرة، والنجم الرئيسي في هذه الكوكبة هو من المرتبة الثالثة .

وتحتوي هذه الكوكبة كذلك السديم اللولي الذي يعرف عادة باسم " الدوامة " .

• كوكب الأرض وقمره

الأرض كوكب من كواكب المجموعة الشمسية يبلغ متوسط قطره نحو 7.927 ميل، ويزيد طول القطر الاستوائي على طول القطر القطبي بنحو 27 ميل.

ويرجح الباحثون بأن هذه الزيادة في طول القطر الأستوائي ترجع إلى تأثير عمليات دوران الأرض حول نفسها وبفعل قوة الطرد المركبة وخاصة أثناء المراحل الأولى التي تكون خلالها كوكب الأرض.

وتدور الأرض حول الشمس دورة كاملة كل عام وينجم عن اختلاف موقع الأرض بالنسبة للشمس خلال فترة دورانها هذه تكوين الفصول الأربع، في حين تدور الأرض حول نفسها (أو حول محورها) دورة كاملة في اليوم الواحد، وينشأ عن ذلك تعاقب الليل والنهار، حيث يكون نصف الكره الأرضية الموجه للشمس مضيئاً و النصف الآخر مظلاً.

وتوضح البيانات الآتية بعض المعلومات الخاصة عن حجم الأرض ومساحتها وكثافتها .

حرف اللام

• اللب

نطاق كروي في وسط الأرض، نصف قطرة (3486 كم)، ويوجد أسفل انقطاع غونيزغ، يمتد من عمق (2900 كم) حتى مركز الأرض، ومقسم إلى جزئين، اللب الداخلي ويوجد في الحالة الصلبة، واللب الخارجي يوجد في الحالة السائلة .

• الورا "كوكبة"

أو السليان، وتقع في المنطقة السابعة، وتحتوي على نجم ساطع من المرتبة الأولى هو (ألف الورا أو النسر الواقع)، وهو المع نجم في السماء الشمالية، ويرى بسهولة من جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، وكذلك من جزء كبير من نصف الكرة الأرضية الجنوبي .

• لوفرييه الفرنسي

اكتشف نبتون عام 1846 م .

• لمبدا الأسد

نجم هو الطرف أو الطرف، المنزل التاسع من منازل القمر .

• لمبدا التثنين

نجم هو ذنب التثنين .

• لمبدا الجاثي

نجم هو معصم الجاثي .

• الباب

كوكبة شمالية هي الذؤابة .

▪ **لمبدا قيطة**

نجم هو المنخر أو منخر قيطة .

▪ **لمبدا**


الحرف الحادي عشر من الحروف اليونانية ويطلق على النجوم ذات الأقدار
الضعيفة .

هوف الميسم

• المرأة المسلسلة " كوكبة "

أو " اندروميدا " ، تقع في جنوب ذات الكرسي ، وفي غرب الفرس الأعظم ،
بها المع سديم حلزوني ، والمع نجوم الكوكبة هي " رأس المسلسلة ، والرثاء ،
ورجل المسلسلة " .

وقد سميت اندروميدا نسبة إلى ما جاء في الأسطورة الإغريقية القديمة ،
التي تصور اندروميدا مشدودة من ذراعيها الممدودتين بسلسلة إلى صخرة في
البحر .



• المجال الجوي

تتمثل في الأجواء التي تعلو المجالين البحري والجوي ، ومن حق كل دولة
أن تنظم الحركة أو المرور في هذا المجال .

• المجرات

تبعد المجرة بشكل سحابة مؤلفة من غازات وغبار كوني وسدم ونجوم وكواكب وأقمار ومنابع وشهب ونيازك، وجميعها في حركة دائمة ومستمرة، وتدور المجرات حول نواها بسرعات مختلفة كما تزداد كثافة النجوم في النوى وقد تكون هناك ثقوب سوداء في النوى، وتنتج عنها حركة دائرية للسحابة بكمالها تؤدي إلى تكويرها وتشكل نواة في السحابة التي يزداد حجمها وتقططها مع ازدياد في سرعة دورانها، وبسبب القوة الزائدة عن المركز تأخذ شكلاً عدسيًا وتحول شيئاً فشيئاً إلى قرص كثيف، هذا التحول من شكل شبيه بالكرة إلى شكل عدسي هو ما قال به العالم أدوين هبل .

صنف العالم أدوين هبل عام 1953 - 1989م المجرات إلى ثلاثة أنواع

رئيسية هي : 1. مجرات كروية .

2. مجرات لولبية حلزونية .

3. مجرات لولبية مقلمة ، ومجرات أخرى عديمة الهيكلة .

■ مجرة درب التبانة

أول من اكتشفها العالم غاليليو عام 1610م وتسمى الطريق اللبني أو نهر المجرة ، وهي المجرة التي تضم شمسنا والمجموعة الشمسية، تتتألف من ملايين النجوم التي تظهر بشكل نقاط ضوئية ممددة على ما يسمى بدرب التبانة أو نهر المجرة، حيث تبعد حوالي 33 ألف سنة ضوئية عن مركز المجرة وتدور مجموعتنا الشمسية حول مركز المجرة بسرعة 105كم /ثا وتحتاج إلى 250 مليون سنة لتم دورتها حول المركز وهو ما يسمى بالسنة الكونية، يبلغ القطر الكبير للمجرة 100 ألف سنة ضوئية، وسمكتها في الوسط 16 ألف سنة ضوئية، فيها أكثر من 400 ألف مليون نجم 5% منها في نواة المجرة والباقي في أذرعها وتقع مجموعتنا الشمسية في أحد هذه الأذرع، وفي المجرة المذنبات والنیازک والکواكب والثقوب

السوداء والغبار الكوني مما لا حصر له حتى الآن وتقع نواة مجرتنا في جهة البرج السماوي المسمى بالسماك الزرامج ، وإذا استطاع إنسان أن يطير بسرعة الضوء فسيصل إلى نواة مجرتنا بعد 50 ألف سنة أرضية .

على الرغم من وجود ملايين المجرات إلا أنه لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة باستثناء المرأة المسلسلة الفريدة منها " 2,2 مليون سنة ضوئية "

• المجرات القصبة

تتألف منة مجموعة مجرات ، كل مجرتين منها ملتصقتان وتتضمن نحوماً وغباراً كونياً وغازاً، وهي ترسل موجات لاسلكية على الرغم من بعدها الشاسع عنا ، ويبحث العلماء عن التقوب السوداء في المزدوجة .

ومن المجرات ما تكون محشودة إلى جانب بعضها كسعر برنقيه الذي يضم 800 مجرة متنوعة .

ومعظم المجرات تطلق كمية كبيرة من الطاقة الراديوية والمادة المندفعة غاز حار مثأين يسميه الفيزيائيون " البلازما " .


أمثلة على هذا النوع : المجرات الممزقة، والمجرات المزدوجة، المجرات المزدوجة الدواره، والمجرات البيضووية المتفجرة، والمجرات المزدوجة المتلاصقة.

• محور الأرض

الخط الوهمي الذي يصل القطب الشمالي بالقطب الجنوبي ماراً بمركز الأرض.

• مدار الجدي

خط عرض (5. 23°) شمالاً أو على الأصح (23° و 28°) جنوباً وهو أقصى امتداد جنوبى لحركة انتقال الشمس الظاهرية وتعامدها عند الظهر، فإن أشعة الشمس تكون عمودية على مدار الجدي عند الانقلاب الشتوي (22 ديسمبر) لنصف الكرة الشمالي والذي هو نفسه الانقلاب الصيفي لنصف الكرة الجنوبي .



▪ مدار السرطان

خط عرض (٢٣°.٥) شمالاً أو على الأصح (٢٣° و ٢٨°) شمالاً وهو أقصى امتداد شمالي لحركة انتقال الشمس الظاهرية وتصاعدتها عند الظهر، فلين أشعة الشمس تكون عمودية على امتداد السرطان عند الانقلاب الصيفي (أيونية).

▪ المذنب

جسم سماوي فضائي مكون من رأس به نواة صخرية معدنية مكسورة ببلورات ثلاثية من الماء والميثان يتبع جزء منها عند اقترابه من الشمس مكوناً ذيلاً.

▪ المريخ

كوكب يبلغ قطره (٤٥٠٠) ميل ، ويبعد عن الشمس بمقابل (١٤٥) مليون ميل ، ويدور حول الشمس كل (٦٨٧) يوماً (أي عامين تقريباً) ويرى في السماء بلون أحمر كلون الشفق وذلك لكتافة الغاز المحاط به، ويمتاز قطباه لمعانها، ويعتقد أن ذلك ناتج من كثرة تراكم الثلوج عليها، ويختلف حجم قرصه وشكله من وقت لآخر تبعاً لاختلاف بعده عن الشمس من موضوع لأخر أثناء دورانه حولها (يلاحظ أن مدار هذه الكواكب ليس كامل الاستدارة تماماً وإنما يبدو

و على شكل بيضاوي ، ولذلك كانت جميع هذه الأبعاد و عبارة عن متوسطات) وهذا يتبع المريخ قمران .

• المثلث

كوكبة صغيرة شمالية بين الحمل والمرأة المسلسلة ، ألفا وبين المثلث هما الميزان .

• المثلث الجنوبي

كوكبة جنوبية حدها الفلكي ببير 1603 ، تتألف من 3 نجوم من القدر الثالث .


• معالم القبة السماوية

إذا نظرت عبر أجهزة الرصد الفلكية إلى السماء تبدو لك الأجرام السماوية " الشمس ، والقمر ، والكواكب ، والنجوم ، وغيرها " وكأنها على سطح داخلي لنصف كرة ضخمة (قبة) ، سميت القبة السماوية .

ونعد الأرض مركز هذه القبة . ولما كانت الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق ، فإن حركة القبة تظهر من الشرق إلى الغرب ، كما في الشكل المرفق .

فحركة الأجرام السماوية على قبة السماء من الشرق إلى الغرب هي ، حركة ظاهرية وليس حقيقة .

كي يستطيع العلماء تحديد موقع الأجرام السماوية ، تعارفوا على معالم بارزة أو مواضع مرجعية تستخدم في تحديد موقع هذه الأجرام على القبة السماوية .



• **المجرة**

كوكبة صغيرة جنوبية فوق ذنب العقرب ألمع نجومها من القدر الثالث .

• **مبادرة الاعتدالين**

تقديم وقت الاعتدالين الخريفي والربيعي لنجم عن تقهقر النقطة الاعتدالية بسبب دوران محور الأرض في الفضاء الذي يقوم بدوره كل 25800 سنة .

• **مسطرة النقاش**

كوكبة جنوبية مولدة بين التلغراف والحمامامة وتسمى المربع أيضاً .

• **المليهيب**

كوكبة شمالية بين الدجاجة والتثنين وذات الكرسي وهي قيفاوس .

• **المنجل**

صورة في برج الأسد تشبه المنجل .

• منكب الجوزاء

نجم ألفا الجوزاء ، نجم متغير قدره بين 1.3-0.4 فئة طيفه M² ، يسميه الغربيون بيط الجوزاء .

• الميزان

كوكبة جنوبية في فلك البروج وترتيبه السابع وفيه :

ألفا الميزان : الكفة الجنوبية .

بيتا الميزان : الكفة الشمالية .

ويشكل المنزل السادس عشر من منازل القمر .

• ممسك الأعناء

هو العناء ، كوكبة شمالية بين الثريا والدب الأكبر ، أكبر وأسطع نجومها العيوق فيها 3 عناقيد نجمية هي م: 36/37/38 إيسيلون ممسك الأعناء عملاق ضخم يبلغ قطره 2000 ضعف قطر الشمس .

منازل القمر :

ASH - SHARATAN	1. الشرطان : ألفا وبيتا الحمل
AL BOTAIN	2. البطين : في الحمل
PLEIADES	3. الثريا : في الثور
AL DEBRIN	4. الدبران : في الثور
AL HAKN	5. الhecعة : في رأس الجبار
AL HANA	6. الهنعة : في الجوزاء
AL DHIRA	7. الذراع المبسوطة في الجوزاء
AL NATHRA	8. النثرة في السرطان
AL TARAF	9. الطرف في الأسد والسرطان
AL JABHA	10. الجبهة في الأسد

AL ZUBRA	الزبرة في الأسد	11.
AL SARFA	الصرفة في الأسد	12.
AL AWA	العواء في السنبلة	13.
AL SIMAK ALAZAL	السماك الأعزل في السنبلة	14.
AL GHAFR	البغفر في السنبلة	15.
AL ZUBANA	الزباني في الميزان	16.
AL IKLIL	الإكليل في العقرب	17.
AL QULAB	قلب العقرب في العقرب	18.
AL SHAULA	الشولة في العقرب	19.
AL NAAIM	النعام في الفرس	20.
AL BALDA	البلدة :	21.
SA' DALDAHBIH	سعد الذابح في الجدي	22.
SA'DBALI	سعد البالع في الدلو	23.
SA'DASSUUD	سعد السعوض في الدلو والجدي	24.
SA'D AL AKB'YA	سعد الأخيبة في الدلو	25.
AL FfARGH AL AWWAL	الفرع المقلم في الفرس	26.
AFARGH AL THANI	الفرع المؤخر في الفرس والمرأة المسلسلة	27.
BATEN ALHUT	بطن الحوت في المرأة المسلسلة	28.

* ميسان *

تُأرجح القمر بالنسبة لمراقب له على سطح الأرض وفيما ينمايل القمر حول محوره مما يجعل القسم المرئي منه أكبر من القسم غير المرئي ويسمى بالتُّأرجح القرقي أحياناً .

▪ ميناء قمرى

قاعدة إطلاق الصواريخ أو القاذف أو الأقمار الصناعية أو إرسالها .

▪ ميل الشمس

المقصود بميل الشمس، هو ميلها عن الوضع العمودي – أي ميل أشعتها – أشعة تเคลلها فيما بين المدارين في حركتها الظاهرية حول الأرض .
وتكون زاوية ميل الشمس صفرًا فوق دائرة الاستواء أشعة الاعتدالين
لتصل إلى $27^{\circ}, 23^{\circ}$ فوق المدارين في تلك الفترة .

وعندما تكون الشمس عمودية على أي من المدارين فإن ميلها عند دائرة الاستواء يكون بمقدار $23,27^{\circ}$ وعند المدار الآخر حوالي 47 درجة .

ليس هذا فقط ، بل يعبر ميل الشمس أيضاً عن ميلها عن الوضع العمودي في أي عرض ، أو أي فترة زمنية (مدار السنة ، أو في ساعات النهار) وبدل ميل الشمس على شدة الأشعة الشمسية الوالصالة إلى سطح الأرض ، إذ أنه كلما قل الميل ازدادت شدة الأشعة ، والعكس صحيح .

▪ الميل الزاوي

البعد الزاوي لنجم أو كوكب عن خط الاستواء السماوي شمالاً يشير إليه +
وجنوباً - - .

▪ المزن الطبقي

هو عبارة عن سحاب كثيف عديم الانظام شكلاً ويتحمل سقوط المطر منه
وهو غامق اللون .

▪ المزن الركامي

هي عبارة عن سحب ترتفع رأسياً حتى تصل لمستوى التكاف ث ويصبحها
سقوط أمطار كثيرة وحدوث الرعد والبرق وأحياناً سقوط البرد .

■ المزوسفير (الغلاف الجوي المتوسط)

هي الطبقة الممتدة من السترانوسفير حتى علو (80) كم تقربياً وتمتاز بانخفاض كبير في درجة الحرارة مع الارتفاع .

■ مساحة الأرض

مساحة الأرض هي $510,066,100 \text{ كم}^2$ ، وإن عمر الأرض هو " 5 " مليارات سنة تقربياً .

■ المشتري

هو أكبر الكواكب في هذه المجموعة، ويكبر عن الأرض بمقدار ألف ومائتي مرة ويرى في غاية الوضوح، ويتبين بأن للمشتري 12 قمراً تابعاً له، وتبعد كتلة المشتري نحو 300 مثلاً لكتلة الأرض تقربياً، ويبعد قطره نحو (250,250) ميل، ومع ذلك يدور حول محوره كل 9 ساعات و 55 دقيقة، ويبعد عن الشمس بمقدار (485) مليون ميل ، ويدور حول الشمس دورة كاملة كل (11) سنة و (314) يوماً ومحوره عمودي على المستوى المداري ولذلك لا تختلف فصوله .

■ معدل اليوم الشمسي

معدل طول اليوم الشمسي ويساوي (24) ساعة أو يوماً كاملاً من الزمن المدنى وطبقاً لانحراف فلك الأرض وميل خط الاستواء نحو مدار الشمس الظاهري فإن طول اليوم الشمسي يختلف قليلاً باختلاف أوقات السنة، ومن ثم يؤخذ متوسط أو معدل طول اليوم الشمسي (واليوم الشمسي) هو عبارة عن الوقت الذي نقطعه الأرض في دورانها حول محورها وهي تدور في نفس الوقت في فلكها حول الشمس، ويمثل تلك الدورة الزمن بين تعامد الشمس على خط طول معين مرتين متتاليتين، وهو لذلك أطول قليلاً من اليوم النجمي بنحو أربع دقائق.

• الموقع الفلكي

هو عبارة عن موقع الدولة على خطوط الطول ودوائر العرض.

• ميزوبيوز

الحد الفاصل بين طبقة ميزوسفير والطبقة التي تليها ،

• ميزوسفير

طبقة تقع ما بين ستراتوبوز وارتفاع حوالي (80) كم، وتقع فيها درجة الحرارة مع الارتفاع، إذ يمكن أن تصعد في نهايتها إلى حوالي (-100[°]S) وهي أبود درجة حرارة في الغلاف الجوي .

• مكوك الفضاء

طور الأميركيون سفناً فضائية تسمح باستعمال مرات عديدة عرفت بمكوك الفضاء إذ أن السفن العابقة كانت تستعاد إلى مياه البحار ثم يجري انتشالها مع من فيها . أما مكوك الفضاء فأشبه بطاولة صغيرة تستطيع أن تهبط على الأرض بسلام لاستخدامها مرة ثانية .

• المحطة الفضائية سكاي لاب

مخبر فضائي بطول 25 متر وعرض 5متر .

تحوي أماكن لإقامة رواد الفضاء وحجر للنوم ومطبخ ومكتبة صغيرة وأدوات تسلية أرسلها الأميركيون إلى الفضاء في 13 آيلار 1973م أعطت معلومات كثيرة لرجال العلم عن الفضاء .

هوكالثون

▪ نبتون

كوكب من الكواكب يبلغ قطره نحو (8,300) ميل ويبعُد عن الشمس بنحو (2792) مليون ميل ، وله أربعة أقمار .

▪ النجوم

جسم ملتهب يشع حرارة ونوراً، والنجوم نجدها متاثرة في الفضاء، وهي تؤلف جسم المجرات مع العناصر الأخرى، يبلغ عدد النجوم في المجرة الواحدة حوالي مئة ألف مليون نجم يشاهد الإنسان بالعين المجردة 3000 نجم تتمي لمجرتنا درب التبانة وفي كل يوم تكتشف نجوم جديدة تضاف إلى مجرات الكون .

▪ النجوم فوق المتفجرة

النجوم التي تعاني من زيادة في إضاعتها تبلغ مئاتآلاف الأضعاف، وحتى مئات الملايين .

▪ النجوم المتغيرة

نجوم تختلف شدة الضوء الخارج منها نتيجة لتغيرات تطرأ على أحطامها ودرجات حرارتها (تعانى من تغير في إضاعتها) .

▪ النثرة

هو نجم إيسيلون السرطان ويسمى نثرة الأسد أو فم الأسد والنثرة من منازل القمر في اليوم الثامن وهي بشكل بقعة بيضاء لبنية .

▪ نجم القطب

أحد النجوم التي ترى بالعين المجردة وهو أقرب النجوم إلى القطب الشمالي للكرة السماوية

▪ النسر الطائر

هو نجم ألفا النسر قدره 0.9 وطيقه 5 ولمعانيه قوي كان العرب يسمون
النسر والقيثارة للنسرتين .

▪ النسر الواقع

هو نجم ألفا القيثارة قدره 0.1 وطيقه أصغر وهو أكثر النجوم الشمالية
تألقاً.

▪ النطاق

نجم هو زيتا الجوزاء وهو أحد نجوم ثلاثة مصطفة على وسطها تسمى بها
العرب منطقة الجوزاء أو نطاق الجوزاء .

▪ نعيم

كوكبة جنوبية من أربعة نجوم ساطعة وبسبعين أقل ضياء، ألفا وغاما نعيم
تنتجه نحو القطب الجنوبي، من أسمائه الصليب الجنوبي أو عرش فيصر .
وهو النجم المتجر حديثاً الذي أطاح الانفجار الأعظم مادته ونتج عن ذلك
ارتفاع في لمعانه ويسما المتجدد الأعظم .

▪ نقطة تلاقي النيازك

نقطة في الكورة السماوية تظهر وكان النيازك تتطلق منها .

▪ النهر

كوكبة جنوبية تمتد على مساحة واسعة ، نجومها من أقدار 3و4 أهمها :
ألفا النهر : آخر النهر .
بيتا النهر : كرسي الجوزاء المتقدم .
غاما النهر : نير الزورق .
ثيتا النهر : الظلليم .
ليتا النهر : أحلى النعام .

▪ النظام

عبارة عن عدد من المتغيرات المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقات متبادلة، فالنظام الأرضي مثلاً يتكون من الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف الحيوي والتربة وما بينهما من علاقات متبادلة .

▪ النظام البيئي

وحدة طبيعية تتتألف من مكونات حية وأخرى غير حية تتفاعل مع بعضها بعضاً وتتبادل فيه المواد الكيمائية والطاقة وفق نظام لتسنم في أداء دورها .

▪ نقطة الاعتدال الخريفي

إحدى نقطتي التقاء دائرة الاستواء السماوي مع دائرة البروج ، ويكون عندها طول الليل مساوياً لطول النهار ، وتكون مؤشراً على بدأ فصل الخريف .

▪ نقطة الاعتدال الربيعي

النقطة الثانية لالتقاء دائرة الاستواء السماوي مع دائرة البروج، يكون عندها طول الليل مساوياً لطول النهار وتكون مؤشراً على بداية فصل الربيع .

▪ نور الفسق

هو ذلك الضوء الملون الأقرب إلى الحمرة الذي يشاهد عادة بعد غروب الشمس مباشرة عندما تكون الشمس قد هبطت نحو الأفق بحوالي 3-4 درجات . وسبب ذلك الضوء الملون الانثار الذي يتعرض له ضوء الشمس بفعل جزيئات الغبار في الجو .

▪ نواة المجرة

منطقة مركز المجرة .

النهر كوبية

من أكبر الكواكب ، يحتوي على نحو 300 نجم ترى بالعين المجردة ، ومع ذلك فليس فيها غير آخر النهر نجم فوق المرتبة الثالثة في اللumen ، والكوكبة تتمتد صوب الجنوب ، بحيث يصب النهر في كوكبة الشجاع .

النَّبِيُّ

أي جزء من الشهاب يستطيع الوصول إلى الأرض قبل أن يتبعه كله في الغلاف الجوي الأرضي وهي عبارة عن أحراام فضائية أصل معظمها من داخل المجموعة الشمسية.

▪ نظرية كات (Kant) سنة 1755

2. حول بعضها البعض، وحدث أن تصادمت نتيجة لتجمعها فتشأ من تصادمها. حرارة شديدة حولت هذه الجسيمات الصلبة المعنمة إلى غازات متوجهة ظهرت على شكل السديم الذي نعرفه اليوم في مجموعة السلافي - وتولدت قوة ساعدت هذه الغازات المتوجهة على الدوران حول نفسها بسرعة عظيمة.

3. ونتيجة لهذه الحركة السريعة، كان لابد أن ينشأ ما يعرف "بالقوة المركزية المطردة" التي نتج عنها بروز الأجزاء الوسطى (الاستوائية) من كثافة السديم، ثم الفصلات منه على شكل حلقات متتابعة ، تكونت كل حلقة منها كوكبا من الكواكب المعروفة لنا.

ثم بقيت بعد ذلك نواة العديم وهي التي تتكون منها شمسنا الحالية. نستخلص من هذه النظرية أن الأرض كانت أحدى هذه الحلقات التي انفصلت من الشمس، إلا أن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها للتعرضها مع النظام الديناميكي - ولكنها ذات قيمة تاريخية كبيرة لأنها كانت أول هذه النظريات الخاصة بنشأة الأرض، وكذلك كانت الأساس الأول الذي بني حوله العالم الفرنسي "لابلاس" نظريته التي راجت فترة طويلة من الزمن.

▪ نظرية لابلاس Laplace (سنة 1796)

هذه هي النظرية التي راجت فترة من الزمن، وعرفت بالنظرية السديمية Nebular Hypothesis والسديم جسم غازي هائل الحجم.

ويعتقد لابلاس في هذه النظرية أن المجموعة الشمسية كانت في أول الأمر سديماً عظيماً جداً وحاراً، كان يملاً فضاء الكون في كل المنطقة الداخلية في مدار تيتون (لم يكون الكوكب العاشر بلتون قد اكتشف بعد)، وكان هذا الجسم الهائل الحجم يتحرك حول نفسه حركة بطيئة في أول الأمر، ثم حدث أن: أ. قلت حرارة هذا الجسم الغازي، نتيجة لبرودته بالإشعاع، فانكمش تدريجياً وبالتالي زادت سرعة دورانه حول نفسه، فانبعخت أجزاء الوسطى بفعل القوة الطاردة المركزية.

ب. وعندما تعادلت القوة الطاردة مع قوة الجذب، لم يكن للأجزاء المنتبعثة أي ثقل، ففتح عن ذلك انفصال هذه الأجزاء الوسطى عن جسم السديم، عندما انكمش من جديد نتيجة لبرودة بالإشعاع، وكانت هذه الأجزاء المنفصلة تبدو على شكل حلقة عظيمة تحيط بالسديم عند منطقته الوسطى وظلت هذه الحلقة المنفصلة تدور في نفس الاتجاه لدوران جسم السديم.

ت. وكان من الطبيعي أن تتكرر نفس العملية، فبرد جسم السديم من جديد، ثم أخذ

ثـ. ينكمش فزالت سرعته حول نفسه، فانبعجت الأجزاء الوسطى نتيجة لقوة الطاردة... ثم انفصلت حلقة جديدة .

وهكذا توالـت الانكمـاشات، فـتـكـرـرـ انـفـصـالـ الحـلـقـاتـ وـاحـدـةـ بـعـدـ الأـخـرـىـ حتـىـ

بلغـ عـدـدـهاـ نـسـعـ حـلـقـاتـ

(أيـ سـعـةـ كـوـاـكـبـ،ـ وـهـيـ التـيـ كـانـتـ مـعـرـوـفـةـ أـيـامـ لـابـلـاسـ).

ويرى لابلاس أن هذه الحلقات التي كانت تدور حول جسم السديم، بررت نتيجة للإشعاع، وإنكمشت كل حلقة، وانفصل استمرارها الدائري في النقطة الضعيفة، ثم تجمعت مادتها - في شكل حلزوني - حول نواة مركزية، ف تكون في النهاية جسم كروي، استمر يحافظ على دورانه حول السديم. وهكذا تكونت الكواكب الحالية من هذه الأجسام الكروية، كما تكونت أقمارها التابعة بنفس الطريقة التي تكونت بها الام المتبوعة (الكواكب) . وبعد أن تم انفصال الكواكب، أخذت الكثلة المركزية من السديم في البرودة والانكماش تدريجيا حتى تكونت الشمس الحالية، وموقعها بالطبع - في مركز مدارات كل الكواكب التي تدور حولها.

وبحسب هذه النظرية - تستخلص أن الأرض كانت حلقة من هذه الحلقات الغازية التي انفصلت عن الشمس ، وأنها كانت عظيمة الحرارة ، ثم أخذت تبرد تدريجيا، حتى تحولت إلى جسم سائل ، ثم إلى جسم صلب.

نظـرـيـةـ جـيـفـرـيزـ -ـ جـيـنـزـ .ـ أوـ نـظـرـيـةـ المـدـ الغـازـيـ :

هذه هي أحدث النظريات الخاصة بنشأة الأرض - تقدم بها العالمان Jeffreys-Jeans لكي يتلافا نقط الصعف في نظرية شمبرلن - مولتن .

وهي تتفق مع النظرية السابقة في أن الكواكب قد انفصلت عن جسم الشمس نتيجة لمرور النجم العظيم قرب الشمس، الا أنها تختلف في طريقة الانفصال ، فترى هذه النظرية الجديدة أن قوة الجذب هي وحدها التي نتج عنها انفصال الكواكب ولا يعترضها بحدوث انفجار في الشمس .

وتعتقد النظرية أن قوة جذب النجم العظيم قد تكونت مدا هائلاً في جانب واحد من الشمس وهو المواجه للنجم ، وأمتد هناك عمود هائل من الغاز بلغ طوله المسافة بين الشمس وبلونتو، وكان سمه عظيماً جداً كما كان قطر هذا العمود الاسطواني كبيراً في الوسط عن الأطراف .

وترى النظرية أن هذا الجزء الأوسط قد بَرَزَ عن الشمس أثناء كان النجم أقرب ما يكون من الشمس .

ثم حدث أن انفصل هذا العمود إلى عشرة أجزاء ، تكونت الكواكب المعروفة من تسع منها، وكُونَ الْجَزْءُ الْعَاشِرُ مَجْمُوعَةً لِلْكَوَافِكَاتِ الَّتِي تَقْعُدُ بَيْنَ الْمَرِيخِ وَالْمَشْتَريِ .

ويعنى هذا أن كل الكواكب كانت في أول الأمر أجساماً غازية، ثم تحولت تدريجياً إلى أجسام سائلة ، ثم تحولت أخيراً إلى الحالة الصلبة .

• نظرية الشمس التوأمية

رجح هذه النظرية العالم الفلكي راسيل Russell N. H. عام 1925، لكي يفسر تكوين أفراد العائلة الشمسية من نجم آخر غير نجم الشمس الأصلي العظيم Primitive Sun وعلى ذلك أوضح راسيل أن شمسنا الحالية كانت عبارة عن زوجين أو توأمين متقاربين في مدارهما و تكونت المجموعة الشمسية من أحد هذين التوأمين، بينما احتفظ التوأم الآخر (شمسنا الحالية) بصورته التي يبدو بها اليوم. وحقق هذه النظرية الدكتور ليتلتون R. A. Lyttleton عام 1936 وأوضح أنه كان للشمس الحالية توأم آخر يبلغ نصف قطره طول المسافة التي تمتد بين زحل وأورانوس ، أي نحو 1700 مليون ميل.

وعلى أساس أن كتلة هذا النجم التوأم كانت مماثلة تماماً لكتلة الشمس، على ذلك فستغرق فترة دوران هذا الكوكب حول نفسه دورة كاملة في نحو 50 سنة ، ويسير بسرعة تبلغ نحو 6 ميل / الثانية فقط .

وعندما تعرض هذا الكوكب الشمسي التوأمي لممرور نجم آخر سيار، يسیر بسرعة 20 ميل / الثانية، نتج عن ذلك تكوين العمود الغازي ، الذي أخذ يبرد بالتدريج وكون المجموعة الشمسية .

* نظرية فايسكر أو نظرية السحب السديمية *

رجح فون فايسcker Von Weizsacker هذه النظرية عام 1944 . وهي تشبه تلك التي رجحها سيمون دي لا بلاس 1796 مع إضافة بعض الاقتراحات الجديدة عليها .

وقد استعمل فايسcker بقوانين الديناميكا الحرارية والفيزياء الإحصائية الى مدى بعيد لتقسيم نشأة كواكب المجموعة الشمسية .
ويعتقد فايسcker أن المجموعة الشمسية بما فيها الشمس كذلك كانت تتتألف من سحب هائلة من السدم التي تسبح فيها الغازات والغبار الكوني والمواد المعدنية الدقيقة الحجم جداً .

وتشبه هذه السدم تلك السحب القرصية التي تحيط بكوكب زحل اليوم . ويوضح فايسcker أن السديم ظاهرة ليست غريبة بل هي موجودة فعلًا في الفضاء الكوني . ومنها السدم العظمى الموجهة Great Nebulae in Orion والسدم القائمة المعتمنة Dark Nebulae وأشهرها سحب " جوالات الفحم " - Coal Nebule . Sack Nebule

وتعتبر هذه السدم عظيمة الحجم جدا حيث يذكر الاستاذ سمارت W. MM. Smart عام 1959 بأنه لو تصادف دخول شمسنا الحالية احدى مجموعات هذه السدم العظمى فلا تخرج نمن الجانب الآخر لها، الا بعد مضي مئات الآلاف من السنوات . وتبعد هذه السدم عن كوكب الأرض ببضعة الاف من السنوات الضوئية.

على ذلك يعتقد فايسكر أن المجموعة الشمسية كانت تتتألف من بعض أجزاء أحدي هذه السدم التي أخذت تسبح في الفضاء الكوني وتبعد عن موقعها الأصلي. ثم نتيجة لعمليات البرودة التدريجية التي تعرضت لها بعد أن انفصلت عن السدم العظمى أخذت تدور حول نفسها.

وتبعد القوى الأحتكاك الناتجة عن فعل تصادم أجزاء المواد الصلبة بالسدم، تولدت قوى حرارية عظمى عزلت على تقسيت جسم السدم إلى أجزاء صغيرة، وكل بدوره أخذ يبرد بالتدرج وتكونت بذلك أفراد المجموعة الشمسية. ورجح بأنه كان هناك في كثرة السحب السديمية العظمى مناطق دوامات غازية (في مناطق الكواكب الكبيرة) تدور في اتجاه عقرب الساعة، ويقع فيما بينها دوامات أخرى تدور في عكس اتجاه عقرب الساعة تكونت منها الكواكب الصغيرة. وقد عدل نظرية فايسكر للدوامات السديمية كل من كولموغروف A. N. Kulper وكيوبر G. P. Kolmogrov فيما بعد.

«نظرية ميلاد النجوم الجديدة»

رجح هذه النظرية الأستاذ هوبل F. Hoyle 1946 وأوضح هذا الباحث أن الفضاء الكوني يشتمل على مجموعات هائلة من كتل السديمية.

وتبعاً للاضطرابات النووية داخل أجسام هذا السدم، يتبثق أحياناً أقماراً كونية صغيرة تتتألف من كتل غازية موجهة. وعندما تبرد هذه الأقمار بالتدرج، تفقد قوتها وتحول إلى كتل متقلصة معتمة، ثم قد تتجذب ثانية نحو جسم السديم الأعظم. وقد أوضح هوبل كذلك بأنه في عام 1582 م.

ظهر نجم جديد في الفضاء عرف باسم Tycho Brahe's Nova ، وقد كان هذا النجم مضيئاً بشدة لمدة عدة أيام متواصلة وشاهدته الناس بالعين المجردة أثناء الليل والنهار ، ويرجع أنه أُنجب ثانية صوب جسم السديم الذي أُنفصل عنه . وفي عام 1918 ، ولد نجم جديد آخر هو Nova Aquilae، زُرْكَانْ هذا النجم أعظم النجوم لمعاناً في الفضاء الكوني حتى نهاية العام الذي ظهر خلاه ، وأصبح ليس له وجود في وقتنا الحالي.

ويعتقد هوبل بأن كواكب المجموعة الشمسية لم تفصل عن جسم الشمس الحالية ذلك لأن تلك الكواكب تقع بعيدة جداً عن موقع شمسنا الحالية، ومن الصعب أرجاع ذلك فعل تطوير الكواكب في الفضاء ثم احتلالها لمدارات خاصة ثابتة بفعل قوة جذب الشمس التي انفصلت وتطايرت منها .

ومن ثم رجح هوبل بأنه كان لشمسنا الحالية نجماً مصاحباً آخر أطلق عليه اسم Supernova وكليهما انفصلاً من جسم سديم غازي عظيم الحجم . وقد تصادف أن أخذ جسم النجم المصاحب لشمسنا الحالية أن يفقد كميّات هائلة من غازاته بفضل الاشعاع، ومن ثم أخذ يتقلص ويتكثّف ويدور حول نفسه بسرعة أكبر مما أدى إلى انفجار وتطاير أجزائه .

ويعتقد هوبل كذلك بأن عملية الانفجار كانت من الشدة بحيث أدت إلى تطوير أجزاء الجسم المصاحب للشمس بعيداً عن الفضاء الكوني الذي نعرفه، وأما بقایا نواته فقد ظلت قريبة من جسم الشمس وهي التي تعرضت لعملية التلقيح والبرودة والأنكماش والتقطیت ثم الدوران، وتكونت منها كواكب المجموعة الشمسية التي تحتمت قوة جذب شمسنا الحالية في تجديد مدارات هذه الكواكب .

ويؤكد هوبل بأن الفضاء الخارجي يحتوي على الكثي من المجموعات السديم التي تعد أعظم حجماً من شمسنا الحالية بألاف المرات، وتتعرض أجزاء هذه السدم لتفاعلات نووية ينجم عنها تطوير بعض أجزائها في الفضاء، ثم سرعان ما

تجذب تلك الأجزاء المتطايرة إلى جسم السدم بعد بروزتها وعندما تفقد قدرتها على الاستقلال بذاتها في الفضاء.

ويذكرنا هوبيل بأنه من أحسن أمثلة السدم الموجهة Luminous

Nebulae هو "سديم الكابوريا أو السرطان البحري" Garb Nebulae .

وأكّد هوبيل حجم هذا السديم الأخير لا يزال أحدها في الازدياد التدريجي المستمر بمعدل 800 ميل في الثانية، وأنه ينبع على بعد 400 سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

ولكن لم يفسر الأستاذ هوبيل كيفية حدوث التفاعلات النووية Nuclear reaction داخل أجسام السدم، وأسباب اختلاف طبيعة هذه التفاعلات من سديم إلى آخر .

كما لم يوضح دورة هذه التفاعلات و النتائج التي تترجم عن حدوثها في كل دورة أو مرحلة.

وبنها لغير "هوبيل" فإن أفراد المجموعة الشمسية ما هي إلا انباتاً تفترس عن جسم السديم العظيم الذي يبعد كثيراً عن مواقع هذه الكواكب .

حيث انفصلت هذه الكواكب من زمن بعيد لذا فقد تلاشى لمعانها وضوئها، ويردت بالتدرج، ثم شكلت هذه السدم طبيعة تركيبها المعدني ونظام ترتيب هذه المعادن داخل أجسامها وساعدتها في ذلك عملية دوران هذه الكتل حول نفسها بعد أن تعرضت للبرودة التدريجية . كما ساهمت قوى الجذب بين الأقمار على الاحتفاظ بمواعدها الحالية ودورانها حول نفسها في مدارات خاصة بالفضاء الكوني.

• نظرية الانفجارات النووية

رجح هذه النظرية العالم الفلكي الباجيكي جورج لاميتر George

Lemaitre عام 1931 وأكّدتها من بعده العالم الفلكي الروسي Gamow George عام 1946 .

وتلخص هذه النظرية في أن قسماً من الفضاء الكوني وهو الواقع فيما بين مدار الأرض حول الشمس تقريباً مان يتلاف من غازات كثيفة وقد ألق جامبو على التجمعات الغازية الأولى اسم المجرة الأولى . Proto galaxies . وبمرور الزمن اندحت ذرات هذه الغازات مع بعضها وكونت الخلايا النوية .

وقد صاحب تكوين الخلايا النوية انفجارات عظيمة أدت إلى تمايز الأجرام الكونية في محيط أعظم اتساعاً من المحيط التي كانت تشغله الغازات من قبل ، وكونت ما يعرف باسم المجرة الفلكية .

وبعد عملية الانفجارات النوية بدأت تتكثف الغازات من جديد وبالتالي تمر بعمليات التلاصق والانكماش والدوران وميلاد كواكب جديدة في الفضاء الخارجي . وقد رجح جامو Gamow بأن حركة الانفجار النووي حدثت من مدة 10 - 13 مليون سنة مضت ، وفي حين بدأت عملية تكتيف الغازات بنحو 250 مليون سنة بعد حدوث عملية الانفجار النووي .

أما العالم الكيميائي هارولد أوري H. C. Urey، فقد أوضح أن أفراد المجموعة الشمسية كانت عبارة عن سحب غازية ينتشر فيها المواد الصلبة الدقيقة الحجم ، وكانت تحيط بالشمس الأصلية على شكل قرص غازي مستدير الشكل A disk around the primitive sun A واعتذر أوري أن جسم الشمس الأولى كان أكثر استقراراً بالنسبة للأطراف الهامشية للشمس .

وعلى ذلك تعرض هذا القرص الغازي المستدير لعمليات التقسيت والتقسيم، وتبعاً لذلك الغازية عن بعضها .

وتبعاً للخصائص العامة للموقع الجديد الذي احتلتتها الكتل في الفضاء الكوني تعرضت لعمليات البرودة التدريجية، وتكونت كواكب المجموعة الشمسية . وينكر " أوري " أن أهم المواد التي تدخل في تركيب هذه الكتل الغازية هي السليكات، الحديد، والمياه، والنشادر .

وبناءً لعمليات البرودة التدريجية تكاثفت المياه وغاز الفشار بينما تتألف مركز هذه الكتل من النikel وال الحديد والمواد التي لا زالت منصهرة حتى اليوم كما هو الحال بالنسبة للكوكب الأرض وعلى الرغم من تعدد الأراء والنظريات التي قدمت منذ بداية هذا القرن لتقسيم نشأة المجموعة الشمسية، إلا أنه كما يذكر الاستاذ W. M. Smart بأننا ربما سوف لا نعلم الطريقة الحقيقية التي تكونت بها كواكب هذه المجموعة وكيف جاءت على الوجود .


كما ذكر العالم هارولد أوري عام 1952، أنه عند تعرض الباحث لمشكلة نشأة الأرض وتقسيم ميلادها يجد نفسه بحاجة ماسة إلى معجزات الاهمية تساهم معه في هذا التقسيم مهما كانت دقة المناهج العلمية التي يستعين بها

* النظام البيئي

هو عبارة عن وحدة طبيعية تتألف من مكونات حية وأخرى غير حية تتفاعل بعضها مع بعضها الآخر ، وتتبادل فيه المكونات الحية وغير الحياة العلاقات تأثراً وتتأثراً وفق نظام متوازن توازن دينامياً، لستمر في أداء دورها في استمرارية الحياة .

أن الأنظمة البيئية تحتوي على عناصر ومواد ، فالمادة هي المكون الأساسي للأنظمة البيئية وتدخل في تركيب مكوناتها الحية وغير الحياة، وبالتالي يمكننا القول أن النظام البيئي يخضع للقوانين الأساسية في علوم الفيزياء والكيمياء وبخاصة قوانين حفظ المادة والطاقة .

يعد النظام البيئي أحد مستويات الحياة كما يوضحه التسلسل الآتي:



▪ نيران القيس المو " او الموس "

هذه من ظواهر الجو الطبيعية التي تشاهد عندما يخيم الظلام بعيداً عن مصادر الأضواء الطبيعية أو الصناعية على السواء، وسببها تغيرات كهربائية خففة بطيئة بين الشحنات التي يحملها الهواء والأجسام المرتفعة فوق سطح الأرض على النحو التالي:

هذا التغير الكهربائي الطبيعي أزيزيل لغير "الفرشة" المعروف في تجارب معامل الطبيعة، يظهر عادة على هيئة رؤوس من الضوء على نهاية الأجسام المدببة التي على غرار برج الكنيسة، وصارى السفينه، أو حتى نتوءات الأرض المنبسطة. وعادة تصاحبها صوضاء طقطقة أو أزيز :

وتشاهد نيران سانت المو أكبر ما تشاهد في المستويات المنخفضة من الأرض خلال موسم الشتاء "أثناء وفي أعقاب عواصف البرد" وأسم سانت المو هو لفظ إيطالي حرفي عن سانت أرمون، وأصله سانت أرموس وهو الباب في مدة حكم دومتيان، وقد حطمته سفينته في يوم 2 يونيو عام 304م.

ومنذ ذلك الحين اعتبر ذلك القديس الراعي لبحارة البحر المتوسط، أولئك الذين جعلوا نيران سانت المو بمثابة العلامة المرئية لحماية لهم، وعرفت الظاهرة عند قدماء الإغريق. ويقول "بلن" في كتابه "التاريخ الطبيعي" انه كلما تواجد صواعان كانت للبحارة تسميهما التوأمان واعتبروهما بمثابة الجسم المقدس.

هرف الماء

• هالة

الضوء الدائري المحيط بالشمس أو القمر، الذي يظهر تحت ظروف بعينها، ويساعد على ظهوره وجود مواد معلقة في الغلاف الجوي، ويثنون الضوء في بعض الأحيان نتيجة الانكسار .
والهالة عادة تكون أكثر وضوحاً قرب القطبين .

• الهايروسفير

الجزء العلوي من الغلاف الجوي الأرضي تكون نسبة الأكسجين والنيدروجين والغازات الأخرى غير ثابتة وغير محددة تتخللها إشعاعات دقيقة مختلطة مع جسيمات الهواء .

• هرم

أحد السيارات الصغرى بين المريخ والمشتري قطره 1 سم يقترب من الأرض كثيراً، كما حدث عام 1937 حيث اقترب إلى مسافة 780000 كم .

• الهنعة

هي غماً وبسي التوأميين وهي المنزل السادس من منازل القمر .

• هيدالفو

أحد السيارات الصغرى بين المريخ والمشتري مساره غير دائري يقترب من مدار زحل .

من الماء

• ولیم ہرشل 1738 – 1822م

انگلیزی من أصل ألماني أكتشف أورانوس وقمرين لزحل .

■ وَذِيَّدُ الْقَرْنِ ■ كُوْكِبَةٌ ■

أو مكرون، تقع في المنطقة المسماة الشعري اليمانية، وهي المنطقة التي تدعوي طائفه من الكوكبات تمثل الجبار محوطاً بحيوانات، وهو يشمل كل كوكبتي الجبار والكلب الأصغر، كما يشمل أجزاء كبيرة من كوكبات "الكلب الأكبر" و "الثور" و "الأرنب"، وأهمها جميراً كوكبة مكرون أو "وحيد القرن" نسبة إلى "الحيوان ذي القرن الواحد"، الذي يعيش في وسط إفريقيا.

وَنَنِ الْأَرْض

وزنها 6000 میلیون میلیون طن .

الوحدة الفلكية

الصوئية لقياسات المسافات بين النجوم والوحدة الفلكية حوالي 150 مليون كم .

• وجد القرن

كوكبة استوائية مولدة وهي نجوم متفرقة تقع بين الكلب الأكبر والأصغر للرأس تحت رجل التوامين والذنب تحت رأس الشجاع وزبانة السرطان .

حركة البياء

• يوم نجمي

الفترة الزمنية التي يستغرقها أي نجم ليدور دورة كاملة في رحلته الظاهرية حول النجم القطبي وهو يمثل فترة دورة الأرض حول محورها وتعادل (4) ثانية (56) دقيقة و (23) ساعة ومن ثم فهي تقل عن معدل اليوم الشمسي بـ (56) ثانية (3) دقائق .

• يوهانس كيلر 1571 - 1630م

ولد في فورتبرغ، أحدث ثورة في دراسة علم الفلك بعد اكتشافه قوانين حركة الأرض والسيارات .

وقوانينه هي :

1. مدارات السيارات قطوع ناقصة تقع الشمس في أحد محرقيها
2. السطوح المرسومة بنصف القطر السعادي متناسبة مع الأزمنة اللازمة لها.
3. مربعات الأزمنة التي تستغرقها السيارات في رسماها متناسبة مع مكعبات محاور مداراتها في الكون .

• اليمامة " كوكبة "

تقع ضمن مجموعة عظيمة من الكواكب ، تشمل "أرجو أو السفينة" و "الغراب" ، و "الأرنب" ، و "الشجاع" ، و "الحياة المائية" ، و "الباطية" ، و "الكأس" ، ويرى البعض أن كوكبة اليمامة تمثل صورة من قصة الطوفان المعروفة .

• يابتيوس

تابع صغير لزحل يختلف صياؤه حسب موقعه في شرق السيار أو غربه .

• يوم 10

تابع للمشتري اكتشافه غاليليو 1609 وسيمون ماريوس في السنة نفسها،
يشبه القمر بحجمه وكثافته له جو رقيق وطبقة مؤينة .

• اليوم الشمسي

هي المسافة الزمنية بين عبورين متتاليين للشمس في هاجرة نقطة ما .

• اليوم النجمي

سهوا اليوم الفلكي طوله 23 سا و 56 د و 4,09 ثا .

مسد المصطلحات الخاصة بالمجموعة الشمسية

Leo	الأسد
Leo Minor	الأسد الأصغر
Lepus	الأرنب
Cygnus	البجعة (الدجاجة)
Pixies	البوصلة
Perseus	برشيوس " الجبال "
Gemin	التوأمان
Drago	التنين
Corona Borealis	النافع الشمالي " الإكليل "
Corona Australis	النافع الجنوبي " الإكليل "
Vulpecula	الثعلب
Taurus	الثور
Celestial Sphere	كرة سماوية
Circle OF Ihumination	دائرة الإضاءة
Cirrocumulus (Cc)	سمحاق ركامي " غيوم "
Cirrostratus (Cs)	سمحاق طبقي " غيوم "
Cirrus (Ci)	سمحاق " غيوم "

Clear Sky	سماء صافية
Cosmic Dust	غبار كوني
Corona	أكيليل
Cosmic Rays	أشعة كونية
Capricornus	الجدي
Orion	الجوزاء
Aries	الحمل
Caelum	الحفارة
Cetus	"الحوت " قيطس "
Chamaeleon	الحرباء
Columbs	الحمامة
Equaleus	الحصان الصغير
Pecasus	الحصان المنجح (الفرس الأعظم)
Hudrus	حية الماء
Ophiuchus	حامل الحية
Pictor	الحامل
Serpens	الحية
Coma Berenices	خصلة الشعر
Aquarius	الدلو

Scutum	الدرع
Vsa majpr	الدب الأكبر. (بنات النعش الكبرى)
Ursa Miner	الدب الأصغر (بنات نعش الصغرى)
Delphinus	الدلفين
Auriga	ذو الأعنة
Cassiopela	ذات الكرسي
Lupus	الذئب
Musca	الذبابية
Bootes	الراعي (العرواء)
Sagitta	الرمح (الرامي)
Camel Oparadus	الزرافة
Cancer	السرطان
Dorado	السمك المذهب
Piscis Austrinus	السمك الجنوبي
Arcturus	السمك الراوح
Lacerta	السحلية (العظائية)
Volans	السمك الطائر
Sextans	السدس
Pisces	السمك
Hydra	الشجاع
Norma	الشاقول

Reticulum	الشبكة
Vela	الشراع
Crux	الصلب (نعيم)
Ara	طائر (المجرة)
Pavo	الطاووس
Tucana	الطوكان
Phoenix	العنقاء
Scorpius	العقرب
Virgo	العذراء
Gorvus	الغراب
Grus	الغرنوق
Fornox	القرن (الكور)
Antlia	القرن
Carina	القرينة
Cent Aurus	قططورس
Cephus	قيفلوس
Lyra	القيثارة (الشلياق)
Octans	القوس
Canis venatici	كلاب الصيد
Canis major	الكلب الكبير
Canis minor	الكلب الصغير

Crater	الكأس (الباطنية)
Puppis	القوس
Andromeda	المرأة المسلسلة
Circinus	المعقوف
Libra	الميزان
Mensa	المائدة
Telescopium	المرصد
Triangulum	المثلث
Triangulum austral	المثلث الجنوبي
Microscopium	المجهر
Aquila	النسر (العقاب)
Eridanus	النهر
Sculptor	الذخات
Hercules	هرقل (الجائي)
Indus	الهندي
Horologium	الوشاح
Lynx	الوشق
Monoceros	وحيد القرن
Risha	الرشا
Rhea	الربا
Reticulom	الشبكة

Regulus	قلب الأسد
Serpens	الحية
Sagittarius	الرامي (القوس)
Saros	الساهر
Sajitta	السهم
Scorpius	العقرب
Sculptor	كرسي النحات
Sickle	المنجل
Titan	تيتان
Titania	تيتانيا
Tethys	تيسيس
Taurus	الثور
Tocana	الطوقان
Trojans	الكويكبات الطرودية
Trangulum	المثلث
Umbriel	امبريل
Ursa major	الدب الأكبر
Ursa minor	الدب الأصغر
Van allevn belts	أحزنة فان آلن
Vela	الأشرعة
Vul pecula	الثعلب والأوزة

Virgo	العذراء
Vega	النسر الواقع
Zebra	الزبانيان
Zebra	زبرة الأسد
Eridanns	النهر
Izar	الإزار
Icarus	إيكاروس
Iapetos	بابيتروس
Io	يو
Janus	جانوس
Juno	جونو
Lepus	الأرنب
Leo	الأسد
Leo Minor	الأسد الأصغر
Lupus	الذئب
Lacerate	العظائية سحلية
Lyra	القيثارة
Muscida	الخطام - الخطام
Musca	الذبابة
Magellan Cloups	غيمتا ماجلان
Norma	مسطرة النقاش

Oberon	أوبيرون
Octans	الثمن
Orion	الجبار
Pallas	بالاس
Proxima	بروكسيما
Pyxis	بوصلة الملاح
Pleades	الثريا
Perseus	حامل رأس لغول
Pisces	الحوت
Piscis Austrinus	الحوت الجنوبي
Pavo	الطاووس
Phoenix	العنقاء
Procyon	الغميصاء
Pegasus	الفرس العظيم
Perseus	فرساوس
Pherkad	الفرقد
Pictor	كرسي المصور
Praeseps	النثرة
Polaris	نجم القطب
Rasal Gethi	رأس الجائي
Rigel	الرجل

Capricornus	الجدي
Chamaeuon	الحرباء
Coma Berenices	الحزمة ، الذئبة ، شعر برينقة
Columba	الحمامة
Corvus	الخباء ، الغراب
Cassiopeia	ذات الكرسي
Camelopardus	الزراقة
Cancer	السرطان
Centaurus	الظلمان ، قنطورس
Crux	عرش فيصر ، نعيم ، صليب
	الجنوب
Cepheus	قيفاوس الملهب
Cetus	قيطس
Crater	الكأس الباطية
Canis Minor	الكلب الأصغر
Cais Major	الكلب الأكبر
Coma Bernice	كوارة اللبلاب
Constellation	الكوكبة
Coal SACX	كيس الفحم
Dorado	أبو سيف
Drago	التنين

Delphnus	الدلفين
Daimos	ديموس
Dione	ديونا
Ensladus	انسلاودوس
Europa	أوروبا
Eros	إيروس
Eouuleus	الفرس الأصغر
Furud	الفروذ ، النسق
Fornax	الكور
Gemin	توأمان
Ghafar	الغفر
Grus	الكركي
Hydra	الثعبان ، الشجاع
Shdrus	ثعبان البحر ، الشجاع الأصغر
Hercules	الراقص الجائى
Hyades	القلائص
Hermes	هرمس
Hdalgo	هيدالغو
Nchernar	آخر النهر (الظليم)
Amalthea	أمالثيا
Apollo	ابولو

Ariel	أرييل
Astrea	استريا
Amor	آمور
Algenb	الجانب
Asiuns Boreales	الحظيرة
Aries	الحمل
Alcor	الخوار
Auriga	ذو الأعناء ، العنار
Adib	الذئب
Algol	رأس الغول
Adhfara	زيتا الأسد
Aouarius	الساقي ، ساكي الماء ، الدلو
Albau	سعد بالع (بلغ)
Argo	سفينة
Arcturus	السماك الرامح
Apus	طائر الفردوس (الجنة)
Alterf	الطرف
Adara	العذاري
Aouila	العقاب
AL Cyone	عقد التريا
Almach – Almak	العناق

AL Phecca	الفكه
AL Kaid	القائد
Antares	قلب العقرب
Andromeda	المراة المسلسلة
AL Tair	النسر الطائر

مسد مصطلحات المجموعة الشمسية

حرف الألف	
Actinograph	أكتينو غلاف :
Actinometer	أكتينو ميتر :
Alpin Glow	ألق (وهج) ألبى
Apogee	أوج قمري
Equinox	اعتدال " فلكي "
Uranus	أورانوس
ACHERNAR	آخر نهر
AMALTHEA	أمثاليا
Galilean moons	اقمار غاليليو
DORADO	أبو سيف
APOLLO	أبولو
VAN ALLEN BELTS	لحزمة فان آلن
PARALLAX	اختلاف المنظر
ARGON	أرغون
LEPUS	الأرنب
LEPUS	أرييل
IZAR	الإزار

NITROGEN	الأزوت
ITROGEN	استرنيا
LEO	الأسد
LEO MINOR	الأسد الأصغر
VELA	الأشرعة
SOLAR RADIATION	الإشعاع الشمسي
RADIANCE	الإشعاعية
BETARAYS	أشعة بيتا
X-RAYS	أشعة سينية
ULTRAVIOETRAYS	أشعة فوق بنفسجية
COSMICRAYS	أشعة كونية
EQUINOXES	الإعتدالين
CONJUNCTION	الاقتران
EXOSPHERE	أيكيزوسفر
OXYGEN	أوكسجين
CORONA	الإكليل
CORON AUSTRALIS	الإكليل الجنوبي
CORON BOREALS	الإكليل الشمالي
ALBEDO	أليبيدو
AMBRIEL	أمبيريل

حرف الباء	
PIUTO	بلوتو
BAR	بار
CARTER	باتية
PALLAS	بالاس
FULL MOON	بدر
LIGHTNING	برق
PROTON	بروتون
PROXIMA	بروكسيما
BOTEIN	البطين
PLANISPHERE	پلانيسفير
PULSAR	پلسار
URSAE MAJORIS	بنات نعش الكجرى
PYXIS	بوصلة الملاح
BETA	بيتا
BETA LEONIS	بيتا الأسد
BETA ANDROMEDA	بيتا المرأة المسلسلة
BETA AQULAE	بيتا النسر
BETA ERIDANI	بيتا النهر
BETA CRUXIS	بيتا نعيم

حرف التاء	
SATELLITE	تابع
SOLARFLAR	تأجع الشمس
IONIZATION	تأين
RETROGRADE	تراجعى
PERTURBATION	ترجماف
PRECESSION OF EQUINOXES	تقدّم الاعتدالين
TRITON	تريتون
ASTRONDMICAL ALMANAC	تقويم فلكي
GEMINI	توأمان
Tropopause	تروبوبوز
Troposphere	تروبوبسفير
TWINKLING	التلاؤ

ASTROLOGY	تنبیه
TELESCOPIUM	تلسكوب
CYGNUS	السم
DRAGO	الدракون
TITAN	تيتان
TETHYS	تیثیس
حرف الثاء	
Thermosphere	ثيرموسفير (الطبقة الحرارية)
SOLAR CONSTANT	ثابت شمسي
CARBON DIOXIDE	ثاني أكسيد الكربون
SECOND	ثانية
PLEADES	ثريا
HYDRA	ثعبان
HYDRUS	ثعبان البحر
VULPECULA	الثعلب والوزة
OCTANS	الثمن
BINARY	ثنائي
TAURUS	الثور
حرف الجيم	
HERCULES	الجاثي

ALGENB	الجانب
JANUS	جاتووس
PERSUS	الجبار
CAPRICORNUS	الجدي
ORION	الجوزاء : (التوأمان)
JUNO	جونو
HALOPOPULATION	جمهرة هالية
حرف الحاء	
CAPELLA	الحادي الحادي
METEORITE	الحجر النيزكي أو الرجم
CHAMAELION	الحرباء
COMA BERENICES	الحزمة
PERIHELION	الحضيض الشمسي
PERIGEE	الحضيض القمري
ASINUS BOREALIS	الحظيرة
DIAMOND RING	الحلقة الماسية
COLUMBA	الحمامة
ARIES	الحمل
OPHIUCHUS	الحواء
PISCES	الحوت

PISCIS AUSTRALIS	الحوت الجنوبي
SERPENS	الحية
حرف الخاء	
Lunar eclipse	بكسوف القمر
Lunar eclipse Total	كسوف القمر الكلي
Partial Lunar eclipse	كسوف القمر الجزئي
CORONA AUSTRALIS	الخباء
CORVUS	الخباء والخياء اليماني
EGRESS	الخروج
ECLIPSE	الكسوف
SPECTRAL LINES	خطوط طيفية
CELESTIAL EQUATOR	خط الاستواء السماوي
CELESTIAL MERIDIAN	خط الزوال الفلكي
TERMINATOR	الخط الفاصل
MUSCIDA	الخطم أو الخطام
ALCOR	الخوار
حرف الدال	
Horizon Circle	دائرة الأفق
Meridian Circle	دائرة زوال الراصد

Celestial Equator	دائرة استواء السماء
Circle	
Hour Circle	دائرة الساعة
Ecliptic Circle	دائرة البروج
URSA MAJOR	الدب الأكبر
URSA MINOR	الدب الأصغر
CYGNUS	الدجاجة (التم)
DELPHINUS	الدلفين :
Ecliptic Circle	دائرة الكسوف
AQUARIUS	الدلو
METONIC CYCLE	الدور الميتوني
DAIMOS	ديموس
DIONE	ديونا
حرف الذال	
ARMILLARY SPHERE	ذات الحلق
MUSCA	الذبابة
CUBIT	الذراع المبسوطة
DENEbol	ذنب الأسد
LUPUS	الذئب
CASSIOPEIA	ذات الكرسي
COMA BERENICES	الذؤابة

AURIGA	ذو الأعناء
ADIB	النَّيْحَ
حرف الراء	
RADAR	رَادَار
APEX	الرَّأْسُ
RAS ALGETHI	رَأْسُ الْجَاثِي
ALGOL	رَأْسُ الْفَوْلِ
QUADRANT	الرَّبِيعَةُ
ALRAKIS	الرَّاقِصُ
BOOTES	رَاعِي الشَّاءِ
SAGITTARIUS	الرَّامِيُّ وَالْقَوْسُ
RISHA	الرَّجُلُ
RISHA	الرَّشَا
RHEA	رِيَا
حرف الزاء	
Saturn	زَحْلٌ
ACUBENS	الزَّيْبَانُ
ZUBAN	الزَّيَانِيَانُ
GAMEL OPARDOLIS	الزَّرَافَةُ

SIDEREAL TIME	الزمان النجمي
Celestial Declination	زاوية الميل السماوي
ADHFARA	زيتا الأسد
DOPPLER SHIFT	زيحان دوببلر
حرف السين	
Stratosphere	ستراتوسفير (الغلاف الجوي الأعلى)
Stratopause	ستراتوبوز
Meission Nebul Ae	السديم الباث
Dark Nebulae	السديم المظلم
Rcfl Ection Nebulae	سديم الانعكاس
Azimuth and Nazir	السمت والنظير
AQUARIUS	الساقي (ساكيب الماء)
SAROS	الساهور
ZODIACAL CLOUD	سحابة بروجية
PLANETARY NEBULAE	السدم الكوكبية
NEBULA	السديم
CANCER	السرطان
VELOCITY OF ESCAPE	سرعة الإفلات
SPEED OF LIGHT	سرعة الضوء

ALBALI	سعد بالع (بلغ)
ARGO	السفينة
ZENIT	السمت
SAGITTA	السهم
CANOPUS	سهيل
ARCTURUS	السماك الراوح
PLANET	السيار
OUTER PLANETS	السيارات الخارجية
INTER PLANETS	السيارات الداخلية
حرف الشين	
RETICULUM	الشبكة
HYDRUS	الشجاع الأصغر
HYDRA	الشجاع
TWILIGHT	الشقق
AURORA POLARIS	الشقق القطبي
MIDNIGHT SUN	شمس منتصف الليل
Zenith	شهاب
SIDEREAL MONTH	الشهر النجمي
PROMINENCE	الشواظ

حرف الصاد	
CRUX	صليب الجنوب
BOOTES	الصناج- الصباح
FACULAM	صياخذ الشمس
حرف الضاد	
ATMOSPHERIC PRESSURE	الضغط الجوي
ZODIACAL LIGHT	الضوء البيروجي
SOLAR NOISE	ضوضاء الشمس
حرف الطاء	
PAVO	الطاووس
APUS	طائر الطاووس
ALTERF	الطرف
CORTONA	الطفاؤة
LIMB	الطف
TUCANA	الطوقان
EMISSION SPECTRUM	الطيف الومضى
Absorption Spectrum	طيف الامتصاص
حرف القاء	
CENTAURUS	الظلمان

ACHERNAR	الظليم
حرف العين	
ADARA	العذاري
ALUDRA	العذرة
VIRGO	العذراء (السنبولة)
ARABIA	عرباً
CRUX	عرش قيصر
LACERTA	العظائية
AQUILA	العقاب (النسر)
ALCYONE	عقد الثريا
NODE	العقدة
SCORPIO	العقرب
COSMOLOGY	علم الكوينات
RADIOASTRONOMY	علم الفلك الإشعاعي
AURIGA	العناز (ممسمك الأعناء)
ALMAK و ALMACH	العناق
PHOENIX	العنقاء
BOOTES	العرواء
CAPELIA	العيوق

حرف الغين

COSMIC DUST	الغبار الكوني
Biosphere	الغلاف الحيوي
Atmosphere	الغلاف الجوي
CORVUS	الغراب
PROCYON	الغيمصاء
GAMA ANDROMEDA	غما المرأة المسسلة
ALGOL	الفول:
MAGELLANIC CLOUDS	غيمنتا ماجلان

حرف القاء

Seasons	فصول فلكية
Astronomical	
Aeronautical Chart	مصور الملاحة الجوية
Photosphere	الفوتوفيلير
Meteorite Crater	فوهة نيزكية
PEGASUS	الفرس الأعظم
PERSEUS	فرساوس
PHERKAD	الفرقد
FURUD	القرود: (القرود)
VESTA	فستا

ALPHECCA	الفكدة
ECLIPTIC	فلق البروج
EPICYCLE	فلق التدوير
PARSEC	الفرسخ النجمي
حرف الفاف	
ALKASID	القائد
SOLAR APEX	قبلة الشمس
SOLAR ANTAPEX	قبلة الشمس المضادة
MAGNITUDE	القدر
Stellar Magnitude	القدر النجمي
Absolute Stellar Magnitude	القدر المطلق
APPARENT MAGNITUDE	القدر الظاهر
WHITE DWARF	القزم الأبيض
CORONA AUSTRALIS	القبة
HYADES	القلانص
Equatorial Celestial Poles	القطبان السماويان الاستوائيان
REGULUS	قلب الأسد
ANTARES	قلب العقرب
CAELUM	قلب النحات

LYRA	القيثارة : (الشلياق)
CETUS	فيطس الحوت
CEPHEID VARIABLES	متغيرات قيفاوية
Kepler,s Laws	قوانين كبلر
حرف الكاف	
Solar eclipse	كسوف
Total Solar eclipse	كسوف الشمس الكلي
Partial Solar eclipse	كسوف الشمس الجزئي
Annular Solar eclipse	كسوف الشمس الحلقي
CRATER	الكأس
ARIES	الكبش (الحمل)
PICTOR	كرسي المصور
SCULPTOR	كرسي النحات
GRUS	الكري
CANIS MINOR	الكلب الأصغر
CANIS MAJOR	الكلب الأكبر
COMA BERENICES	كواردة
FORNAX	الكور
CONSTELLATION	الكوكبة

TROJANS	الكويكبات الطرودية
COAL SACK	كيس الفحم
universe	الكون
The asteroids	الكويكبات
Chromosphere	الクロموسفير
Corona	الكورونا
Terrestrial Planets	الكواكب الأرضية
حرف اللام	
LAMBDA LEONES	لمبدا الأسد
LAMBDA DRACONIS	لمبدا التنين
LAMBDA HERCULIS	لمبدا الجاثي
COMA BERENICES	الثبلاب
LAMBDA CETI	لمبدا قيطس
LAMBDA	لمبدا
حرف العيم	
Milky way	مجرة درب التبانة
TRANGULUM	المثلث
TRANGULUM AUSTRAL	المثلث الجنوبي
Celestial Sphere	معالم القبة السماوية
ARA	المجرة

TROPIC OF CAPRICORN	مدار الجدي
TROPIC OF CANCER	مدار السرطان
PRECESSION OF EQUINOXES	مباردة الاعتدالين
ANDROMEDA	المرأة المسلسلة
NORMA	مسطرة النقاش
CEPHEUS	الماتهب
SICKLE	المنجل
BETELGEUSE	منكب الجوزاء
LIBRA	الميزان
AURIGA	ممسك الأعنة
MOON STATIONS	منازل القمر
LIBRATION	ميسان
SPASEPORT	ميناء قمري
Sun's Declination	ميل الشمس
DECLINATION	الميل الزاوي
Mesosphere	المزوسفير (الغلاف الجوي المتوسط)
Jupiter	المشتري
Mesopause	ميزوبوز
حرف النون	
Neptune	نبتون

PRAESEPE	الثلثة
POLARIS	نجم القطب
Nova	النجم المستعر
Variable Stars	النجوم المتغيرة
Neutron Stars	النجوم النيوترونية
Supernova	النجوم فوق المستعرة
AL TAIR	النسر الطائر
VEGA	النسر الواقع
ALNTAK	النطاق
CRUX	تعييم
RADIANT	نقطة تلاقي النيازك
ERIDANUS	النهر
After-Glow	نور الغسق
(سنة 1755) Kant	نظريّة كانت
(سنة 1796) Laplace	نظريّة لابلاس
The Binary Star Theory	نظريّة الشمس التوأم
The Nebular – Cloud Theory	نظريّة فايسكر أو نظريّة السحب السدليّة
The Nova Theory	نظريّة ميلاد النجوم الجديدة
Autumnal Equinox	نقطة الاعتدال الخريفي

Vernal Equinox	نقطة الاعتدال الربيعي
Meteorite	نيزك
حرف الهاء	
HETEROSPHERE	الهيتروسفير
HERMES	هرمس
AL HENA	الهنعة
HIDALGO	هيدالغو
حرف التاء	
ASTRONONMICAL UNIT	الوحدة الفلكية
MONOCEROS	وحيد القرن
حرف الياء	
IAPETOS	يلابتيوس
IO	يو
SOLAR DAY	اليوم الشمسي
SIDEREAL DAY	اليوم النجمي

المراجع

- (1) حسن سيد أحمد أبو العينين / كوكب الأرض / ظواهر التضاريسية الكبرى / دار النهضة العربية بيروت 1979 م .
- (2) ترجمة أحمد محمود النجدي / علم طبقات الأرض / والمتجرات المجهريّة / دار المعارف مصر 1988 م .
- (3) عادل حاتم جوزي / الجيولوجيا للجميع / دار الرشيد / العراق 1980 م .
- (4) د. محمد يوسف حسن وآخرون / أساسيات علم الجيولوجيا / مركز الكتب الأردني 1990 م .
- (5) اوستن ملر / مدخل في المناخ والبيئة والأرصاد الجوية / تعریف د. محمد متولي وإبراهيم رزقانه / مكتبة الأنجلو المصرية 1989م.
- (6) د. سعد حسن صالح باشا/ الجيولوجيا العامة / علوم الأرض / مؤسسة زهران للنشر والتوزيع 1992 م .
- (7) د. بحبيبي محمد أنور وآخرون / الجيولوجيا العامة / دار المطبوعات الجديدة / الإسكندرية / 1983 م .
- (8) د. نعمان شحادة / علم المناخ / نشر بدعم من الجامعة الأردنية – عمان
- (9) د. أحمد سعيد حديد وآخرون – المناخ المحلي / جامعة بغداد – العراق.
- (10) د. محمد جمال الدين الغندى / الأرصاد الجوية / مصر ط 2 1982 م .
- (11) د. حميد مجول وفياض عبد اللطيف النجم/ فزياء الجو والفضاء/ الأنواء الجوية / وزارة التعليم والبحث العلمي ج 1- بغداد 1982 م .
- (12) محمود عصام العيداني/الأطلس الفلكي/ دار دمشق للنشر والتوزيع/دمشق 1996م.

- (13) جوده حسنين جوده / معالم سطح الأرض / بيروت 1966م.
- (14) محمد صفي الدين / قشرة الأرض / القاهرة 1957م.
- (15) صلاح الدين البيطار / علم الفلك / مطبعة العلوم والآداب / هاشمي إخوان 1950م.
- (16) فايز فوق العادة / ارتحال إلى أعماق الكون / وزارة الثقافة السورية دمشق 1984م.
- (17) يول ديفيس / العالم الأخرى / ترجمة د. حاتم النجدي / دار طلاس .
- (18) ألكسندر مارشال / العالم في الفضاء / ترجمة عصام طه / 1985 ط 1 — 1992م.
- (19) مصطلحات الفلك في التعليم العالمي / المؤتمر الثالث للتعريب / جامعة الدول العربية / الدار البيضاء / 1977م.
- (20) د. علي موسى ومخلص الرئيس / درب التبانة / دار دمشق 1988م.
- (21) د. علي موسى ومخلص الرئيس / بروج السماء — دار دمشق 1988م .
- (22) مروج الذهب للمسعودي — الجزء الأول .
- (23) إشراف — علي البشناوي / الفضاء الداخلي والخارجي — الموسوعة العلمية الشاملة (24) د. عبد الرحمن حميده — أعلام الجغرافيين العرب — دار الفكر — دمشق 1980م .
- (25) إبراهيم حلمي الغوري، كويكبات البروج — دار الشرق العربي— بيروت
- (26) إبراهيم حلمي الغوري ، الكون — دار الشرق العربي — بيروت .
- (27) د. علي موسى ، المعجم الفلكي الحديث ، دار الصافي — دمشق 1995م.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
5	الاهداء
7	المقدمة
11	حرف الالف
33	حرف الباء
39	حرف التاء
45	حرف الثاء
49	حرف الجيم
53	حرف الحاء
57	حرف الخاء
63	حرف الدال
73	حرف الذال
77	حرف الراء
79	حرف الزاي
83	حرف السين
91	حرف الشين
95	حرف الصاد
97	حرف الضاد

الصفحة	الموضوع
99	حرف الطاء
101	حرف الظاء
103	حرف العين
107	حرف الغين
111	حرف الفاء
117	حرف القاف
127	حرف الكاف
135	حرف الام
137	حرف الميم
149	حرف النون
163	حرف الهاء
165	حرف الواو
167	حرف الياء



لنشر و توزيع

دار البيان لنشر و توزيع

عمان - شارع الملك حسين - مجمع الفحيد التجاري

هاتف: ٤٦٤٠٦٧٩ - تلفاكس: ٤٦٤٠٥٩٧

ص.ب ٥١٠٣٣٦ عمان ١١١٥١ الأردن



ISBN 9957-452-27-4

